

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre le médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Fusicutan® Crème

Dermapharm AG

Qu'est-ce que Fusicutan et quand est-il utilisé?

Fusicutan est un antibiotique utilisé sur prescription du médecin pour traiter ou prévenir les infections bactériennes de la peau.

Fusicutan crème convient particulièrement bien en cas d'infections du visage et du cuir chevelu.

Quand Fusicutan ne doit-il pas être utilisé?

Vous ne devez pas utiliser Fusicutan en cas d'hypersensibilité connue au principe actif acide fusidique, fusidate de sodium ou à l'un des excipients selon la composition (voir aussi «Que contient Fusicutan?»).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Fusicutan?

Si l'infection cutanée ne s'améliore pas après quelques jours de traitement, il convient de consulter votre médecin; une allergie ou une infection due à des germes résistants pourrait en être la cause.

Lors de l'utilisation sur le visage, il faut éviter tout contact avec les yeux.

Fusicutan contient du cétylalcool, du sorbate de potassium (E202) et du butylhydroxyanisole (E320), susceptibles de provoquer des réactions cutanées (par ex. dermatite de contact). Le butylhydroxyanisole (E320) peut aussi entraîner des irritations au niveau des yeux et des muqueuses.

En cas de traitement par Fusicutan dans la région génitale ou anale et d'utilisation simultanée de préservatifs en latex, une diminution de la résistance à la déchirure et donc une diminution de la sécurité du préservatif est possible, en raison de la présence des excipients paraffine et vaseline.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments ou des médicaments en usage externe (même en automédication).

Fusicutan peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte, si souhaitez l'être ou si vous allaitez votre enfant, vous ne devez utiliser Fusicutan qu'après avoir consulté votre médecin.

Si le médecin prescrit Fusicutan pendant l'allaitement, la préparation ne doit pas être appliquée sur la poitrine.

Comment utiliser Fusicutan?

Sauf avis contraire de votre médecin, Fusicutan Crème sera appliquée 2 à 3 fois par jour, pendant 7 jours, sur les zones affectées de la peau.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Fusicutan peut-il provoquer?

L'utilisation de Fusicutan peut provoquer les effets secondaires suivants:



Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Des inflammations de la peau (y compris de l'eczéma), des éruptions cutanées (qui peuvent s'accompagner de pustules, de vésicules et de rougeurs), des démangeaisons, une rougeur de la peau, des douleurs (y compris une sensation de brûlure de la peau) ou une irritation au site d'utilisation ont été observés.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Des réactions d'hypersensibilité, des inflammations de la conjonctive, un angio-œdème (gonflement soudain, indolore de la peau et de la muqueuse), urticaire ou formation de vésicules.

En cas de survenue de réactions d'hypersensibilité, surtout si celles-ci s'accompagnent d'un gonflement de la peau et des muqueuses, ainsi qu'en cas de survenue d'urticaire ou de formation de vésicules, veuillez en informer immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Remarques concernant le stockage

Conserver le médicament hors de la portée des enfants.

Ne pas conserver Fusicutan Crème au-dessus de 30 °C.

Stabilité

N'utiliser le médicament que jusqu'à la date de péremption figurant sur la boîte sous la mention «EXP».

Délai d'utilisation après ouverture

La durée de stabilité est de 6 mois après ouverture.

Remarques complémentaires

Les médicaments périmés doivent être rapportés à la pharmacie pour être éliminés.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Ces personnes disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Fusicutan?

Principes actifs

1 g de crème contient 20,3 mg d'acide fusidique (0,5 H₂O) comme principe actif correspondant à 20,0 mg d'acide fusidique anhydre.

Excipients

eau purifiée, paraffine liquide, glycérol 85 %, cétylalcool, vaseline blanche, polysorbate 60, acide chlorhydrique 10 %, sorbate de potassium (E202), butylhydroxyanisole (E320), tout-rac- α -tocophérol (E307).

Numéro d'autorisation

61359 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Fusicutan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacies, uniquement sur ordonnance médicale.

Crème: tubes de 15 g et 30 g.

Titulaire de l'autorisation

Dermapharm AG, Hünenberg



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

