

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fusicutan® Crème

Dermapharm AG

Che cos'è Fusicutan e quando si usa?

Fusicutan è un antibiotico e viene impiegato su prescrizione medica per combattere e prevenire le infezioni batteriche della pelle.

La crema Fusicutan è indicata in particolare nelle infezioni della pelle del viso e del cuoio capelluto.

Quando non si può usare Fusicutan?

In caso di una ipersensibilità esistente all'acido fusidico, al fusidato di sodio o ad una delle sostanze ausiliarie seconda la composizione non deve usare i medicinali Fusicutan (vedere anche «Cosa contiene Fusicutan»).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Fusicutan?

Se una malattia della pelle non risponde al trattamento entro alcuni giorni, consulti il suo medico; la causa può essere un'allergia o un'infezione causata da germi resistenti.

Nell'impiego sul viso, va evitato il contatto con gli occhi.

Fusicutan contiene alcool cetilico, sorbato di potassio (E202) nonché butilidrossianisolo (E320), che può determinare reazioni cutanee locali (p. es. dermatite da contatto). Il butilidrossianisolo (E320) può inoltre causare irritazioni agli occhi e alle mucose.

In caso di trattamento con Fusicutan della regione genitale o anale e di uso concomitante di preservativi in lattice, le sostanze ausiliarie paraffina e vaselina contenute nella crema possono ridurre la resistenza dei preservativi e di conseguenza anche la loro sicurezza.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma o applichi altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Fusicutan durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è in gravidanza, se desidera una gravidanza o se è in allattamento, usi Fusicutan solo dopo aver consultato il medico.

Se Fusicutan è prescritto durante l'allattamento, il preparato non può essere applicato sul seno.

Come usare Fusicutan?

Salvo diversa indicazione del medico, Fucidin crema è applicata sulla parte interessata 2-3 volte al giornodurante 7 giorni.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Fusicutan?

Con l'applicazione di Fusicutan possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)



Infiammazioni cutanee (incluso eczemi), eruzioni cutanee (possono accompagnate da pustole, vescicole e arrossamento), prurito, arrossamento cutaneo, dolore (compresa la sensazione di bruciore sulla pelle) o irritazione nel punto di applicazione.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10 000)

Reazioni di ipersensibilità, congiuntivite, angioedema (gonfiore e dolore improvviso di pelle e mucose), orticaria o formazione di bolle.

Alla comparsa di reazioni di ipersensibilità, in particolare se accompagnate da gonfiore di pelle e mucose, come pure alla comparsa di orticaria e bolle, informi immediatamente il suo medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Istruzioni di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare Fusicutan Crema a temperatura non superiore ai 30 °C.

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

La validità dopo l'apertura corrisponde a 6 mesi.

Ulteriori indicazioni

I medicinali scaduti vanno consegnati in farmacia per lo smaltimento.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Fusicutan?

Principi attivi

1 g di crema contiene come principio attivo 20,3 mg di acido fusidico (0,5 H₂O) corrispondenti a 20,0 mg di acido fusidico privo di acqua.

Sostanze ausiliarie

acqua purificata, paraffina liquida densa, glicerolo 85%, alcool cetilico, vaselina bianca, polisorbato 60, acido cloridrico 10%, sorbato di potassio (E 202), idrossianisolo butilato (E 320), tutto-rac- α -tocoferolo (E307)

Numero dell'omologazione

61359 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Fusicutan? Quali confezioni sono disponibili?

Fusicutan Crema è ottenibile in farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Crema: Tubi da 15 g e da 30 g.

Titolare dell'omologazione

Dermapharm AG, Hünenberg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

