

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Formasan, Liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique

Quand Formasan est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Formasan peut être utilisé en cas de rhumatisme musculaire ou articulaire, d'eczémas, d'asthme bronchique et d'allergies.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Formasan peut être pris simultanément.

Quand Formasan ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

En raison du manque d'études faites chez les enfants, ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans.

Ce médicament contient 111 mg d'alcool (éthanol) par prise de 10 gouttes ($\approx 0,28$ ml), cela correspond à 400 mg/ml (51 % vol.) d'éthanol. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 10 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 3 ml de bière ou 2 ml de vin.

La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Formasan peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Formasan?

Sauf prescription contraire du médecin: adultes et adolescents à partir de 12 ans: Dans les phases aiguës, prendre 5-10 gouttes toutes les 30-60 minutes, au maximum 12 fois par jour. En présence d'évolution



chronique, prendre 5 gouttes 1-3 fois par jour. Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Formasan peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Formasan et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Formasan n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'à» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Formasan?

1 ml de liquide (36 gouttes) contient:

Principes actifs

Acidum formicicum (HAB) D6 0,25 ml

Acidum formicicum (HAB) D12 0,25 ml

Acidum formicicum (HAB) D30 0,25 ml

Acidum formicicum (HAB) D200 0,25 ml

Excipients

Éthanol, eau purifiée

Contient 51 % de vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

53425 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Formasan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?



En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 100 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabricant

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

