

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perchè contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin e quando si usano?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin trovano principalmente impiego in caso di infezioni delle vie urinarie, di vescica irritabile.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin. E' importante bere molto durante il trattamento per garantire il buon funzionamento delle vie urinarie. In caso di disturbi recidivanti o persistenti per più giorni consultare il medico. Infezioni urinarie gravi possono avere conseguenze serie se non sono curate adeguatamente.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

Le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin non é indicato per i bambini al di sotto dei 12 anni senza il parere del medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin?

Salvo diversa prescrizione medica, nei casi acuti, assumere 10 gocce, in poca acqua, ogni ora, poi ogni 2 ore. A miglioramento ottenuto passare a 10-15 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al dì. In caso di disturbi cronici assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 2-3 volte al dì fino a completa guarigione. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin e informi il medico o il farmacista.

Di che altro occorre tener conto?



Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal vostro medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 36 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin?

10 ml contengono: Berberis vulgaris D4 1 ml, Equisetum hiemale D6 1 ml, Eupatorium purpureum D6 1 ml, Lytta vesicatoria (Cantharis) D4 1 ml, Solanum dulcamara D4 1 ml e come eccipienti alcool e acqua.

Contiene alcool 36 % Vol.

Numero dell'omologazione

45047

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R18 Cystophylin? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia senza ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 07/2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

