

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Dexeryl[®], Crema

Pierre Fabre Pharma AG

Che cos'è Dexeryl, crema e quando si usa?

Dexeryl è una crema lenitiva ed idratante che, negli adulti e nei bambini, combatte la pelle secca e la rende morbida. I principi attivi di Dexeryl, crema sono glicerina, vaselina e olio di paraffina. Dexeryl, crema aumenta, grazie alla glicerina, il tasso d'idratazione della pelle e rigenera, grazie alla vaselina e all'olio di paraffina, la funzione protettiva della pelle. Dexeryl, crema ripristina quindi l'idratazione e la funzione protettiva della pelle e riduce le irritazioni cutanee, il prurito e il bisogno di grattarsi.

Dexeryl, crema viene utilizzata per il trattamento della pelle secca in caso di determinate dermatosi (malattie della pelle), ad esempio in caso di ittiosi (pelle secca e desquamata).

Quando non si può usare Dexeryl, crema?

Dexeryl, crema non deve essere utilizzata se si è ipersensibili (allergici) ai principi attivi o ad una delle sostanze ausiliarie di Dexeryl.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Dexeryl, crema?

Dexeryl, crema non deve essere utilizzata su ferite infette o sotto bendaggi occlusivi. Questo medicamento contiene propile paraidrossibenzoato, che può causare reazioni allergiche, anche reazioni ritardate.

Non ingerire.

Non utilizzare su neonati prematuri.

Dexeryl non ha effetti sulla capacità di guidare veicoli o sulla capacità di utilizzare macchine.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Dexeryl, crema durante la gravidanza o l'allattamento?

Dexeryl crema può essere utilizzata durante la gravidanza. Se è in gravidanza o allatta al seno, se sospetta di essere in gravidanza o se desidera una gravidanza, chieda consiglio al suo medico o al suo farmacista prima di utilizzare questo medicamento.

Dexeryl può essere usato durante l'allattamento. Ma durante l'allattamento, si raccomanda di non utilizzare Dexeryl, crema sul seno al fine di evitare un'ingestione accidentale di Dexeryl, crema da parte del bambino.

Non sono attesi effetti sulla fertilità associati a Dexeryl, crema.

Come usare Dexeryl, crema?

Via di applicazione:

Applicazione sulla pelle, destinato all'uso esterno.

Tipo di applicazione e posologia:

Adulti e bambini: applicare la crema due volte al giorno, o al bisogno più frequentemente, in uno strato sottile sulle zone da trattare in tutte le parti del corpo interessate.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Dexeryl, crema?

Come tutti i medicinali, Dexeryl, crema può avere degli effetti collaterali che però non si presentano necessariamente in ogni persona.

Gli effetti collaterali osservati nel trattamento dell'orticaria riguardano principalmente la pelle.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Orticaria, infiammazione cutanea, eczema, arrossamenti e prurito, eruzione cutanea, irritazioni, dolore in sede di applicazione

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Sensazione di bruciore.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. *Termine di consumo dopo l'apertura*

- Tubo: 6 mesi
- Flacone a pompa: 90 giorni

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Conservare nella confezione originale. Tenere ben chiuso il contenitore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Dexeryl, crema?

Principi attivi

100 g di Dexeryl, crema contengono 15,0 g di glicerina, 8,0 g di vaselina bianca e 2,0 g di paraffina liquida

Sostanze ausiliarie

Acido stearico, glicerolo monostearato 40-55, ciclometicone, dimeticone, macrogol 600, trolamina, propile paraidrossibenzoato, acqua purificata

Numero dell'omologazione

60'404 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Dexeryl, crema? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubo da 50 g e 250 g. Flacone a pompa da 500 g

Titolare dell'omologazione

Pierre Fabre Pharma AG, Basel

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

