

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Antidry calm, Antidry calm sensitive

Merz Pharma (Schweiz) AG

Qu'est-ce que Antidry calm / Antidry calm sensitive et quand doit-il être utilisé?

Antidry calm / Antidry calm sensitive contient de l'huile d'amande, de l'acide lactique et du polidocanol 600, des principes actifs qui améliorent et normalisent l'état de la peau en cas d'affections cutanées sèches et prurigineuses. L'association d'huile d'amande douce et d'acide lactique – qui représente un composant important du facteur hydratant naturel de la peau (NMF, Natural Moisture Factor) – rétablit l'hydratation et la teneur en lipides de la peau. Le polidocanol a quant à lui un effet légèrement anesthésiant qui soulage les démangeaisons. Le pH physiologique d'Antidry calm / Antidry calm sensitive stabilise le manteau acide protecteur de la peau, rétablissant ainsi la fonction protectrice naturelle de celle-ci.

Les deux émulsions Antidry calm sensitive et Antidry calm se distinguent uniquement par le fait qu'Antidry calm contient un parfum.

Antidry calm / Antidry calm sensitive est utilisé:

- pour le soin de la peau sensible ou légèrement enflammée et lors de sécheresse cutanée;
- comme traitement de soutien en cas de diverses affections cutanées sèches ou prurigineuses, tels l'eczéma chronique (neurodermite) et l'eczéma par dessèchement;
- comme traitement externe, en alternance avec des médicaments hautement efficaces et selon la prescription médicale;
- pour les soins de la peau après le bain ou la douche; après un contact intense avec des produits de nettoyage et des solvants; lors de conditions climatiques extrêmes (froid, temps sec, vent, soleil).

Quand Antidry calm / Antidry calm sensitive lotion ne doit-il pas être utilisé?

En cas d'hypersensibilité à l'un des composants contenus dans le produit.

Lors d'érythrodermie aiguë (= rougeur inflammatoire ou desquamation de la peau sur l'ensemble du corps) et en cas d'atteintes cutanées inflammatoires aiguës, suintantes et infectées.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Antidry calm / Antidry calm sensitive?

Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune autre précaution particulière n'est requise.

Ce médicament contient du butylhydroxyanisole (E 320). Le butylhydroxyanisole (E 320) peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Ce médicament contient de l'alcool céstéarylique. L'alcool céstéarylique peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Ce médicament (uniquement la variante parfumée appelée Antidry calm) contient un parfum avec entre autres du 3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcool benzylique, cinnamal, alcool cinnamique, citral, citronellol, coumarine, eugénol, géraniol, d-limonène, linalool et de l'acide benzoïque (E210).



Ces composés parfumés peuvent provoquer des réactions allergiques.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Antidry calm / calm sensitive lotion peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Antidry calm/ Antidry calm sensitive?

Sauf prescription médicale contraire appliquer Antidry calm / Antidry calm sensitive plusieurs fois par jour, en fonction des besoins, et masser légèrement pour la faire pénétrer. La durée du traitement dépend du tableau clinique et s'étend généralement sur trois semaines. Si la peau sèche et les démangeaisons persistent, le produit peut – sur recommandation du médecin – être utilisé sur une période plus longue.

En automédication, Antidry calm / Antidry calm sensitive peut être appliqué jusqu'à 3 semaines chez l'enfant à partir de 2 ans. Il convient de consulter préalablement le médecin pour un traitement plus long chez l'enfant âgé de 2 à 12 ans.

L'utilisation chez l'enfant de moins de 2 ans n'est pas recommandée.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou, au contraire, trop forte.

Quels effets secondaires Antidry calm / Antidry cam sensitive peut-il provoquer?

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10'000)

Réactions allergiques localisées.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Instructions de stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Antidry calm/ Antidry calm sensitive?

Antidry calm contient pour 1 g d'émulsion:

Principes actifs

Solution de lactate de sodium (S) 121.65mg et acide lactique (S) à 90% 1,25 mg correspond à 50 mg d'acide lactique (S) anhydre, huile d'amande raffinée 100 mg, macrogol – 9 éther de lauryle 50 mg.



Excipients:

Edétate de sodium, gomme de xanthane, phénoxyéthanol, paraffine liquide, palmitate d'isopropyle, diméticone, glycéryl monostéarate 55-65, macrogol-30-stéarate de glycérol, alcool cétylstéarylique, butylhydroxyanisole (E320), 3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-one, alcool benzylique, cinnamal, alcool cinnamique, citral, citronellol, coumarine, eugénol, géraniol, d-Limonène, linalol, éthanol, acide benzoïque, eau purifiée.

Antidry calm sensitive contient pour 1 g d'émulsion:

Principes actifs

Solution de lactate de sodium (S) 121.65mg et acide lactique (S) à 90% 1,25 mg correspond à 50 mg d'acide lactique (S) anhydre, huile d'amande raffinée 100 mg, macrogol – 9 éther de lauryle 50 mg.

Excipients

Edétate de sodium, gomme de xanthane, phénoxyéthanol, paraffine liquide, palmitate d'isopropyle, diméticone, glycéryl monostéarate 55-65, macrogol-30-stéarate de glycérol, alcool cétylstéarylique, butylhydroxyanisole (E320), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

57964 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Antidry calm / Antidry calm sensitive? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Antidry calm:

Flacons de 200 ml.

Flacons de 500 ml.

Antidry calm sensitive:

Flacons de 200 ml.

Flacons de 500 ml.

Titulaire de l'autorisation

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

