

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SIMILASAN Cérumen, gouttes pour les oreilles

Médicament homéopathique

Quand SIMILASAN Cérumen est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN Cérumen peut être utilisé en soutien en cas d'excès de cérumen avec la sensation que le conduit auditif est légèrement obstrué.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ne pas ingérer les gouttes pour les oreilles et ne pas les appliquer sur les yeux.

Si aucune amélioration n'intervient après 2 jours, il est recommandé de consulter un médecin.

En cas de douleurs aux oreilles, de fièvre, d'écoulement par l'oreille, de baisse d'audition croissante ou soudaine, de sensation de pression accrue dans l'oreille, d'apparition de bruits d'oreille (p. ex. sifflements, bourdonnements), de vertiges et d'inflammation du conduit auditif, il convient de consulter un médecin.

Le cérumen est une sécrétion importante des glandes de l'organisme qui permet de nettoyer le conduit auditif externe, la partie située entre le tympan et le pavillon de l'oreille. Lorsque l'on effectue soi-même des manipulations, p. ex. en introduisant un coton-tige dans le conduit auditif, le cérumen peut pénétrer encore plus profondément dans le conduit auditif et s'y accumuler.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN Cérumen peut être utilisé simultanément.

Quand SIMILASAN Cérumen ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des principes actifs ou excipients.

SIMILASAN Cérumen ne doit pas être utilisé sans prescription médicale chez les enfants de moins de 12 ans.

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas de lésion au niveau de l'oreille ou du conduit auditif, p. ex. en cas de lésion du tympan, d'opération récente de l'oreille ou de lésion et d'inflammation du conduit auditif.

SIMILASAN Cérumen ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres médicaments administrés dans l'oreille.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!)



SIMILASAN Cérumen peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser SIMILASAN Cérumen?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adolescents (de plus de 12 ans) et adultes:

- Appliquer 3 à 5 gouttes 2x par jour dans l'oreille affectée, pendant 2 jours. L'extrémité du compte-gouttes ne doit pas entrer en contact avec l'oreille.
- Il convient d'éviter les manipulations plus profondes dans le conduit auditif, car elles risquent de faire pénétrer le cérumen encore plus profondément dans le conduit auditif. En cas d'obstruction profonde et persistante du conduit auditif, de douleurs ou de fièvre, d'écoulement par l'oreille, de baisse d'audition croissante ou soudaine, de sensation de pression accrue dans l'oreille, d'apparition de bruits d'oreille (p. ex. sifflements, bourdonnements), de vertiges et d'inflammation du conduit auditif, il convient de consulter un médecin.

Une utilisation de plus de 2 jours nécessite un avis médical.

SIMILASAN Cérumen ne doit pas être utilisé sans prescription médicale chez les enfants de moins de 12 ans.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. En règle générale, l'administration du médicament doit être répétée lorsque l'effet diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires SIMILASAN Cérumen peut-il provoquer?

Très rarement ou dans des cas isolés, des réactions d'hypersensibilité ont été observées avec des gouttes pour les oreilles ayant une composition d'excipients comparable, lors d'une utilisation conforme à l'usage prévu, telles une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons ou tuméfactions allant jusqu'à des difficultés respiratoires et à des réactions au niveau du système cardiovasculaire. En cas d'apparition de tels signes pouvant évoquer un choc anaphylactique, contacter immédiatement un médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Cérumen et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité



Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Se conserve 4 semaines après ouverture du flacon.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient SIMILASAN Cérumen?

1 ml de liquide contient:

Principes actifs

Causticum hahnemanni (HAB) D12 0.25 ml, Graphites (HAB) D15 0.25 ml, Lachesis (HAB) D12 (SV, 5a) 0.25 ml, Lycopodium clavatum (HAB) D12 0.25 ml.

Excipients

Eau pour préparations injectables, glycérole (E 422).

1 ml contient 30 gouttes.

Numéro d'autorisation

69619 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SIMILASAN Cérumen? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 10 ml

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

