

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Desloratadin-Mepha 5, comprimés pelliculés

Mepha Pharma AG

Qu'est-ce que Desloratadin-Mepha 5 et quand doit-il être utilisé?

Desloratadin-Mepha 5 améliore les symptômes des rhinites allergiques (par exemple, le rhume des foins), tels qu'éternuements, écoulement nasal ou démangeaisons nasales, congestion nasale, démangeaisons du palais et yeux qui piquent, rouges ou larmoyants.

Desloratadin-Mepha 5 est également utilisé dans le traitement de symptômes associés à l'urticaire (une affection de la peau causée par une allergie). Au nombre de ces symptômes figurent des démangeaisons et une éruption cutanée urticarienne.

Quand Desloratadin-Mepha 5 ne doit-il pas être pris?

Vous ne devez pas utiliser Desloratadin-Mepha 5 si vous êtes hypersensible à la desloratadine ou à la loratadine ou à l'un des autres composants de Desloratadin-Mepha 5.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas prendre les comprimés pelliculés de Desloratadin-Mepha 5.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Desloratadin-Mepha 5?

On ne dispose pas de données pour Desloratadin-Mepha 5 chez les patients souffrant d'affections rénales et hépatiques.

En règle générale, Desloratadin-Mepha 5 n'affecte ni le rendement au travail ni la capacité de concentration. Il est toutefois recommandé de ne pas se livrer à des activités qui exigent une vigilance mentale, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines, avant d'avoir testé ses propres réactions au médicament.

Isomalt (E953)

Si vous présentez une intolérance connue à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre Desloratadin-Mepha 5.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!) ou
- vous avez des antécédents médicaux ou familiaux de convulsions.

Desloratadin-Mepha 5 peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Vous ne pouvez pas prendre Desloratadin-Mepha 5 si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Si vous êtes enceinte, envisagez une grossesse ou allaitez votre enfant, parlez-en à votre médecin.

Comment utiliser Desloratadin-Mepha 5?

Comprimés pelliculés



Adultes et adolescents à partir de 12 ans

Un comprimé pelliculé de Desloratadin-Mepha 5, 5 mg une fois par jour.

Avaler le comprimé pelliculé en entier (sans le croquer) avec de l'eau.

Les comprimés pelliculés de Desloratadin-Mepha 5 peuvent être pris indépendamment des repas.

Enfants de moins de 12 ans

Chez les enfants de moins de 12 ans, il n'est pas possible d'obtenir un ajustement approprié de la dose avec les comprimés pelliculés de Desloratadin-Mepha 5. Pour cette tranche d'âge, il est recommandé d'utiliser une préparation de desloratadine qui permet d'obtenir un dosage plus faible adapté (p.ex. une solution buvable avec le principe actif desloratadine).

Prenez Desloratadin-Mepha 5 aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit.

Avertissez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien si vous avez pris plus de Desloratadin-Mepha 5 que vous n'auriez dû.

Si vous avez oublié de prendre votre médicament, ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée, mais poursuivez le schéma thérapeutique normal et prenez alors la dose suivante.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Desloratadin-Mepha 5 peut-il provoquer?

La prise de Desloratadin-Mepha 5 peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquents (pouvant affecter 1 à 10 patients sur 100): fatigue.

Occasionnels (pouvant affecter 1 à 10 patients sur 1000): maux de tête et sécheresse buccale.

Très rares (pouvant affecter moins de 1 patient sur 10'000): réactions allergiques graves (difficultés respiratoires, respiration sifflante), éruption cutanée et prurit, tachycardie, palpitations, battements irréguliers du cœur, nausées, maux d'estomac, vomissements, embarras gastrique, diarrhée, vertiges, hallucinations, somnolence, agitation liée à des mouvements accrus du corps, crises convulsives, douleurs musculaires, hépatite et troubles de la fonction hépatique.

Fréquence inconnue (fréquence ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles): augmentation de l'appétit.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Remarques concernant le stockage

Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Ne pas conserver au-dessus de 25°C.

Conserver hors de la portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Desloratadin-Mepha 5?

Principes actifs

Desloratadine.

Excipients



Noyau des comprimés:

Isomalt (E953), amidon prégélatinisé, cellulose microcristalline, oxyde de magnésium lourd, hydroxypropylcellulose, crospovidone (type A), stéarate de magnésium.

Enrobage:

Poly(alcool vinylique), dioxyde de titane (E171), macrogol 3350, talc, carmin d'indigo (E132).

Numéro d'autorisation

62374 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Desloratadin-Mepha 5? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Desloratadin-Mepha 5 est disponible en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Comprimés pelliculés

Emballages de 10, 30 et 50 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'autorisation

Mepha Pharma AG, Basel.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Numéro de version interne: 7.1

