

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gavisconell Liquid Mint, sospensione orale in flaconi

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG

Che cos'è Gavisconell Liquid Mint e quando si usa?

Gavisconell Liquid Mint è utilizzato per il trattamento del bruciore di stomaco e dei rigurgiti acidi. Il sodio alginato contenuto in Gavisconell Liquid Mint forma un gel viscoso che si deposita sul contenuto gastrico in modo rapido ed efficace e forma una barriera contro i rigurgiti acidi.

Il sodio bicarbonato e il calcio carbonato neutralizzano una parte dell'acido gastrico in eccesso. Questo sistema consente di eliminare i sintomi provocati dall'acidità di stomaco fino a 4 ore.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Gavisconell Liquid Mint contiene calcio. Se deve seguire una dieta povera di calcio chiedi al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quando non si può assumere Gavisconell Liquid Mint?

Se è ipersensibile (allergico) al sodio alginato, al sodio bicarbonato e al calcio carbonato o a uno degli altri componenti di Gavisconell Liquid Mint.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Gavisconell Liquid Mint?

Chieda consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere, se soffre o abbia sofferto di malattie dei reni o del cuore, poiché alcuni sali possono influire su queste malattie; se i disturbi persistano dopo 7 giorni.

Occorre rispettare un intervallo di 2 ore tra l'assunzione di Gavisconell Liquid Mint e quella di altri medicinali, poiché altrimenti si può compromettere l'azione di questi ultimi.

Gavisconell Liquid Mint contiene 142,6 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per dose da 10 ml di sospensione. Questo equivale al 7,1% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

Parli con il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se lei ha bisogno di 20 ml o più al giorno per un periodo prolungato, specialmente se lei è stato avvisato di seguire una dieta a basso contenuto di sodio.

Gavisconell Liquid Mint contiene i conservanti metile paraidrossibenzoato (E218) e propile paraidrossibenzoato (E216) che possono causare reazioni allergiche, anche ritardate.

Informi il suo medico, o il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie, o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Gavisconell Liquid Mint durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Può assumere questo medicamento se è incinta o se allatta.

Se ha ulteriori domande sull'assunzione di questo medicamento in gravidanza, chiedi al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.



Come usare Gavisconell Liquid Mint?

Per uso orale. Agitare bene prima dell'uso.

Adulti e adolescenti dai 12 anni

Alla comparsa di sintomi, prendere 10-20 ml (2-4 cucchiaini da 5 ml) di sospensione dopo i pasti e prima di coricarsi, fino a 4 volte al giorno.

Se i sintomi non migliorano entro sette giorni, si rivolga al suo medico.

Non indicato per i bambini sotto i 12 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Gavisconell Liquid Mint?

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10'000)

Molto raramente compaiono reazioni allergiche ai componenti, che possono manifestarsi sotto forma di eruzioni cutanee, prurito, problemi respiratori, capogiri o gonfiore del volto, delle labbra, della lingua o della gola.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura, consumare entro 3 mesi.

Istruzioni di conservazione

Non conservare a temperature superiori a 30°C. Non conservare in frigorifero. Non congelare. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Non smaltire il medicamento nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Per contribuire alla protezione dell'ambiente, chiedere al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere come eliminare i medicinali che non si utilizzano più.

Il medico, o il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Gavisconell Liquid Mint?

Sospensione color crema con aroma di menta piperita. 10 ml di sospensione orale contengono:

Principi attivi

500 mg di sodio alginato, 267 mg di sodio bicarbonato e 160 mg di calcio carbonato.

Sostanze ausiliarie

Carbomer 974P, 40 mg di metile paraidrossibenzoato (E218), 6 mg di propile paraidrossibenzoato (E216), saccarina sodica (E954), olio essenziale de menta piperita, sodio idrossido, acqua depurata.

Contiene un totale di 142,6 mg di sodio per 10 ml.

Numero dell'omologazione



66997 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Gavisconell Liquid Mint? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi da 150 ml e 300 ml.

Titolare dell'omologazione

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, 8304 Wallisellen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

RB_PI_IT_20190529

