

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Similasan Mal di viaggio, compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Similasan Mal di viaggio?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Similasan Mal di viaggio può essere usato in caso di cinetosi (da auto, aereo, nave, treno ecc.) con sintomi come nausea, vomito e vertigini.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Similasan Mal di viaggio.

Quando non si può assumere Similasan Mal di viaggio e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Similasan Mal di viaggio può essere somministrato ai bambini sotto i 2 anni solo dietro prescrizione medica. Se le è nota un'intolleranza allo zucchero, consulti il suo medico prima di assumere Similasan Mal di viaggio.

I pazienti affetti da rara intolleranza ereditaria al galattosio, deficit totale di lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicamento.

Consulti un medico se manifesta i seguenti sintomi: vomito, alterazione delle feci o letargia.

Finora non sono note limitazioni d'uso. Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Come usare Similasan Mal di viaggio?

Similasan Mal di viaggio può essere somministrato ai bambini sotto i 2 anni solo dietro prescrizione medica.

Se non diversamente prescritto dal medico.

Bambini dai 2 anni e adulti:

Il giorno del viaggio: 1 compressa prima del viaggio, 1-3 volte. Durante il viaggio, a seconda dello stato: 1 compressa più volte al giorno (ogni mezz'ora).

Posologia massima: 1 compressa 10 volte al giorno.



Indicazione d'uso:

- Lasciar sciogliere la compressa in bocca (ev. masticare).
- Può essere assunto anche a stomaco vuoto.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Similasan Mal di viaggio?

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Similasan Mal di viaggio e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Similasan Mal di viaggio. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.*

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Similasan Mal di viaggio?

1 compressa da 250 mg contiene:

Principi attivi

Strychnos nux-vomica (HAB) D15 (Ph.Eur.Hom 1.1.8) 6,25 mg, Hyoscyamus niger (HAB) D15 6,25 mg, Petroleum rectificatum (HAB) D15 6,25 mg, Anamirta cocculus (HAB) D15 (Ph.Eur.Hom. 1.1.8) 6,25 mg.

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 241.25 mg, amido di mais, magnesio stearato.

Numero dell'omologazione

67813 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Similasan Mal di viaggio? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Dimensioni della confezione: 60 compresse.



Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

