

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

apo-ENTERIT, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa apo-ENTERIT?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, apo-ENTERIT può essere usato in caso di diarrea.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere apo-ENTERIT.

Quando non si può assumere apo-ENTERIT e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di diarrea nei bambini piccoli e nei bambini sotto i 3 anni, è necessario consultare un medico. Se la diarrea è accompagnata da febbre o si sospetta la presenza di sangue nelle feci, è necessario consultare un medico o un farmacista. Soprattutto per le persone anziane e i bambini, è inoltre necessario prestare attenzione a garantire un adeguato apporto di liquidi ed elettroliti.

Se i sintomi persistono per più di 3 giorni o ricompaiono, è necessario consultare un medico o un farmacista. Questo medicamento contiene 95 mg di alcol (etanolo) per 20 gocce e 71 mg di alcol (etanolo) per 15 gocce corrisponde a 176 mg/ml (17,6 % w/v). La quantità in 20 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 3 ml di birra o 1 ml di vino. La quantità in 15 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 2 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol presente in questo medicamento non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere apo-ENTERIT durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare apo-ENTERIT?



Salvo diversa prescrizione medica, assumere il prodotto 3-4 volte al giorno, diluito in un liquido, prima dei pasti. Gli adulti e gli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni assumono 20 gocce, i bambini di età inferiore ai 12 anni assumono 10-15 gocce. Non utilizzare nei bambini e nei lattanti sotto i 3 anni senza consultare un medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere apo-ENTERIT?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con apo-ENTERIT e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di apo-ENTERIT.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene apo-ENTERIT?

1 g di liquido (= 0,98 ml / 38 gocce) contiene:

Principi attivi

Artemisia abrotanum e stipite et foliis spag. Peka D4 (HAB 47a) 175 mg

Peumus boldus e folium spag. Peka D3 (HAB 47b) 165 mg

Gratiola officinalis (HAB) D4 165 mg

Podophyllum peltatum (HAB) D4 175 mg

Potentilla anserina ex herba cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 200 mg

Veratrum album (HAB) D6 120 mg

Sostanze ausiliarie

etanolo, acqua purificata.

Contiene 22 % vol. di alcol.

Numero dell'omologazione



51980 (Swissmedic)

Dove è ottenibile apo-ENTERIT? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

