

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

UPELVA® , Tropfen zum Einnehmen

Homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel

Wann wird UPELVA angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild und dem Therapieprinzip der Spagyrik kann UPELVA bei Menstruationsbeschwerden wie Krämpfen während der Periodenblutung, zu starker Periode eingenommen werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung und dem Therapieprinzip der Spagyrik.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob UPELVA gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf UPELVA nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Dieses Arzneimittel enthält 76,5 mg Alkohol (Ethanol) pro 21 Tropfen entsprechend 160 mg/ml. Die Menge in 21 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf UPELVA während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie UPELVA?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben, Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bis zu 3 mal täglich 14 – 21 Tropfen in Flüssigkeit jeweils vor den Mahlzeiten.

Für Kinder unter 11 Jahren ist die Anwendung nicht empfohlen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten oder mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.



Welche Nebenwirkungen kann UPELVA haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie UPELVA ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Für UPELVA sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "Verwendbar bis" bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in UPELVA enthalten?

1 g Flüssigkeit (1,02 ml / 45 Tropfen) enthält:

Wirkstoffe

Chamaelirium luteum (HAB) D6 125 mg
Cyclamen purpurascens (HAB) D6 125 mg
Datura stramonium (HAB) D12 (HAB 2a) 85 mg
Delphinium staphisagria e semine spag. Peka D6 (HAB 47b) 125 mg
Hypericum perforatum (HAB) D4 145 mg
Kalium carbonicum (HAB) D4 (HAB 5a) 145 mg
Viburnum opulus (HAB) D6 125 mg
Xanthoxylum fraxineum e cortice D6 (HAB 4a) 125 mg

Hilfsstoffe

Ethanol, gereinigtes Wasser
Enthält 20 % V/V Alkohol.

Zulassungsnummer

55326 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie UPELVA? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.



Packungen zu 50 ml.

ZulassungsinhaberIn

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

HerstellerIn

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Diese Packungsbeilage wurde im Januar 2026 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

