

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel hat Ihr Kind entweder von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

NeoCitran Hustenstiller - Tropfen für Kinder

Haleon Schweiz AG

Was sind NeoCitran Hustenstiller Tropfen für Kinder und wann werden sie angewendet?

NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen lindern den Husten und Reizhusten bei Erkältungen.

Auf ärztliche Verschreibung können NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen ebenfalls zur Behandlung akuter Hustenanfälle verschiedenen Ursprungs angewendet werden.

Bei Kindern ab 2 Monaten und bis zu 2 Jahren dürfen NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen nur gemäss ärztlicher Verschreibung verwendet werden.

Aufgrund ihres niedrigen Wirkstoffgehalts sind sie für Jugendliche über 12 Jahre nicht geeignet.

Was sollte dazu beachtet werden?

Die Tropfen sind mit Saccharin und Sorbitol gesüsst und können an diabetische Kinder verabreicht werden.

Wann dürfen NeoCitran Hustenstiller Tropfen für Kinder nicht eingenommen werden?

Sie dürfen NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen nicht anwenden,

- wenn Ihr Kind gegenüber Butamiratscitrat (Wirkstoff) oder einem der Hilfsstoffe allergisch ist,
- wenn Ihr Kind an Fructoseintoleranz leidet, einer (seltenen) angeborenen Erkrankung, bei der die betroffene Person Fructose nicht abbauen kann. NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen enthalten Sorbitol, einen Zucker, der bei der Verdauung Fructose bildet.

Wann ist bei der Einnahme von NeoCitran Hustenstiller Tropfen für Kinder Vorsicht geboten?

Bei Kindern ab 2 Monaten und bis 2 Jahren dürfen NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen nur nach ärztlicher Verschreibung angewendet werden.

Wenn innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt oder wenn sich die Symptome verschlimmern und/oder von Fieber, Hautausschlag oder anhaltenden Kopfschmerzen begleitet sind, muss ein Arzt oder eine Ärztin beigezogen werden.

Wenn der Husten Ihres Kindes produktiv ist, d.h. wenn er mit viel Schleimbildung verbunden ist, sollten Sie vor der Verabreichung der Tropfen Ihren Arzt oder Ihre Ärztin konsultieren. Die Hemmung des Hustenreflexes durch NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen begünstigt einen Sekretstau in den Bronchien, was das Risiko einer Atemwegsinfektion (z.B. einer Lungenentzündung) vergrössert und, darüber hinaus, zu einem gefährlichen Krampf der Bronchien (Bronchospasmus) führen kann. Deshalb sollten Sie davon absehen, gleichzeitig mit NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen hustenlösende Arzneimittel zu verabreichen, welche die Sekrete der Bronchien verflüssigen (Expectorantien und Mucolytika).

Information zu den Hilfsstoffen

Sorbitol: NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen enthalten Sorbitol (284 mg/ml). Sorbitol ist eine Quelle von Fructose (siehe «Wann darf NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen nicht angewendet werden?»). Sprechen Sie mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin bevor Sie Ihrem Kind das Arzneimittel verabreichen, wenn der Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Ihr Kind eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern hat. Sorbitol kann Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen und kann eine leicht abführende Wirkung haben.



Ethanol: NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen enthalten geringe Mengen Alkohol (2.81 mg/ml).

Natrium: NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen enthalten weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Dosis, d.h. sie sind nahezu «natriumfrei».

Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen! Während Ihr Kind NeoCitran Hustenstiller einnimmt, sollte es vermeiden im Strassenverkehr Velo zu fahren.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Ihr Kind

- an anderen Krankheiten leidet,
- Allergien hat oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) anwendet!

Dürfen NeoCitran Hustenstiller Tropfen für Kinder während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen eignen sich nicht für die Behandlung von Husten beim Erwachsenen. Wenn Sie schwanger sind oder stillen und Sie dieses Arzneimittel versehentlich eingenommen haben, sollten Sie vorsichtshalber Ihren Arzt oder Ihre Ärztin benachrichtigen.

Wie verwenden Sie NeoCitran Hustenstiller Tropfen für Kinder?

NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen dürfen Kindern ab 2 Monaten und bis 2 Jahren nur nach ärztlicher Verschreibung gegeben werden.

Wenn vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verordnet:

Kinder von 2 Monaten bis 1 Jahr: 10 Tropfen 4-mal täglich.

Kinder von 1 bis 3 Jahren: 15 Tropfen 4-mal täglich.

Kinder ab 3 Jahren: 25 Tropfen 4-mal täglich.

Die Tropfen sollten möglichst vor den Mahlzeiten eingenommen werden.

Um die Beschwerden zu lindern, sollte immer die niedrigste wirksame Dosis über die kürzest mögliche Zeitdauer verwendet werden.

Bei Husten, der länger als 7 Tage anhält, muss ein Arzt bzw. eine Ärztin beigezogen werden.

Falls Ihr Kind zu viel NeoCitran Hustenstiller eingenommen hat, informieren Sie umgehend Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin. Eine Überdosierung mit NeoCitran Hustenstiller Kindertropfen kann folgende Symptome hervorrufen: Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Gleichgewichtsstörung und niedriger Blutdruck.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen können NeoCitran Hustenstiller Tropfen für Kinder haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von NeoCitran Hustenstiller Tropfen für Kinder auftreten:

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1'000 Anwendern)

Übelkeit, Durchfall oder Schwindel und Schläfrigkeit.

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Anwendern)

Hautausschlag.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser



Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25 °C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Geben Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten an einer Abgabestelle (z.B. Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) oder an einer Sammelstelle zurück. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in NeoCitran Hustenstiller Tropfen für Kinder enthalten?

Wirkstoff

1 ml (= 22 Tropfen) enthält 5 mg Butamiratcitrat.

Hilfsstoffe

Glycerol, Sorbitol (E 420), Saccharin-Natrium, Ethanol, Natriumhydroxid (zur pH Einstellung), Benzoesäure (E 210), Vanillin, gereinigtes Wasser.

Zulassungsnummer

31214 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie NeoCitran Hustenstiller Tropfen für Kinder? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packung zu 20 ml.

Zulassungsinhaberin

Haleon Schweiz AG, Risch.

Diese Packungsbeilage wurde im August 2019 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

