

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Boldocynara® Epato-biliari, gocce per uso orale

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Boldocynara® Epato-biliari e quando si usa?

Boldocynara Epato-biliari è un medicamento fitoterapeutico per stimolare la produzione di bile nel fegato. Boldocynara Epato-biliari si usa in caso di disturbi digestivi quali flatulenza, senso di pesantezza allo stomaco e replezione gastrica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Qualora i disturbi dovessero aggravarsi o durare per più di 14 giorni, consulti il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Quando non si può assumere Boldocynara® Epato-biliari e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Boldocynara Epato-biliari non deve essere utilizzato in caso di gravi disturbi epatici (occlusione delle vie biliari). Non usare in caso di ipersensibilità ad uno dei costituenti della formulazione o alle asteracee in generale (composite come l'arnica o la rudbeckia). Il medicamento non deve essere somministrato a bambini né ad adolescenti di età inferiore a 18 anni. Questo medicamento contiene fino a 264 mg di alcol (etanolo) per dose da 20 gocce, che corrispondono a 488 mg/ml (0,61 % v/v). La quantità contenuta in 20 gocce di questo medicamento corrisponde a meno di 7 ml di birra o di 3 ml di vino. La minima quantità di alcol presente in questo medicamento non ha effetti percettibili.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere nel caso cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere Boldocynara® Epato-biliari durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Boldocynara® Epato-biliari?

Adulti: prendere 3 volte al giorno 15-20 gocce dopo i pasti con poca acqua.

Il medicamento non deve essere somministrato a bambini né ad adolescenti di età inferiore a 18 anni.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Boldocynara® Epato-biliari?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Boldocynara Epato-biliari. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Boldocynara Epato-biliari non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Il medicamento va utilizzato entro 5 mesi dall'apertura.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori della portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

L'intorbidimento che occasionalmente si verifica in tinture di piante fresche non ne pregiudica peraltro l'efficacia terapeutica.

Le confezioni scadute o non esaurite devono essere riportate al farmacista o al droghiere affinché vengano eliminate. Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Boldocynara® Epato-biliari?

1 ml (= 37 gocce) di liquido contiene:

Principi attivi

414 mg di tintura di foglie fresche di carciofo (*Cynara cardunculus* L., folium), rapporto droga-solvente di estrazione 1:30, solvente di estrazione etanolo 65% (v/v);

414 mg di tintura di foglie fresche di tarassaco con radici (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg, herba cum radice), rapporto droga-solvente di estrazione 1:17, solvente di estrazione etanolo 51% (v/v);

64 mg di tintura di foglie di boldo (*Peumus boldus* Molina, folium), rapporto droga-solvente di estrazione 1:10, solvente di estrazione etanolo 70% (v/v);

28 mg di tintura di foglie fresche di menta piperita (*Mentha x piperita* L., herba), rapporto droga-solvente di estrazione 1:18, solvente di estrazione etanolo 65% (v/v).

Il medicamento contiene al massimo 61% vol. di alcol (488 mg di etanolo per 1 ml).

Sostanze ausiliarie

Nessuna

Numero dell'omologazione

55938

Dove è ottenibile Boldocynara® Epato-biliari? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica, in flaconi da 50 ml e 100 ml.

Titolare dell’omologazione

A.Vogel SA, CH-9325 Roggwil TG

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l’ultima volta nel novembre 2024 dall’autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Cronistoria delle revisioni

ID domanda	Tappa fondamentale	Data di creazione	Modifica	Iniziali
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO

