

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Atenolol-Mepha comprimés pelliculés

Mepha Pharma AG

Qu'est-ce que Atenolol-Mepha et quand doit-il être utilisé?

Selon prescription du médecin.

Atenolol-Mepha protège le cœur de toute sollicitation excessive. Le travail du muscle cardiaque s'en trouve diminué et la réaction du cœur au stress, physique et psychique, est atténuée. Atenolol-Mepha abaisse la pression sanguine trop élevée. L'angine de poitrine (oppression très douloureuse au niveau de la poitrine, pouvant irradier dans le bras gauche) se déclare lorsque le cœur ne reçoit plus suffisamment d'oxygène lors d'un effort. Atenolol-Mepha prévient ces crises ou diminue leur fréquence et leur intensité. Un rythme cardiaque irrégulier ou des pulsations augmentées sous l'effet d'une maladie ou du stress peuvent être normalisés grâce à Atenolol-Mepha.

L'aténolol, le principe actif d'Atenolol-Mepha, fait partie d'un groupe de bêtabloquants agissant spécifiquement sur le cœur. Il abaisse la pression trop élevée et diminue l'activité cardiaque, sans influencer les muscles des voies respiratoires. Les patients souffrant d'une affection respiratoire (dyspnée, asthme) peuvent donc prendre Atenolol-Mepha, avec les précautions d'usage.

Votre médecin vous prescrit Atenolol-Mepha:

- pour diminuer une pression trop élevée (hypertension);
- pour protéger le muscle cardiaque de toute surcharge (angine de poitrine);
- pour régulariser les troubles du rythme cardiaque;
- après un infarctus du myocarde;
- pour prévenir un nouvel infarctus.

Quand Atenolol-Mepha ne doit-il pas être utilisé?

Si vous souffrez d'une des maladies suivantes, vous ne devez pas prendre Atenolol-Mepha: si vous avez déjà présenté, par le passé, une réaction allergique au Atenolol-Mepha, resp. au principe actif atéanolol, si vous souffrez d'une maladie du cœur comme faiblesse cardiaque ou bloc cardiaque (pouls inférieur à 50 par minute), si vous avez déjà présenté, par le passé, un pouls très lent ou très irrégulier, une pression artérielle très basse ou une très mauvaise irrigation artérielle, au cas où on a constaté chez vous un phéochromocytome ou après un jeûne prolongé. Atenolol-Mepha n'est pas indiqué pour le traitement des enfants.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise d'Atenolol-Mepha?

Le traitement par ce médicament nécessite un contrôle médical régulier. En fonction de la réaction individuelle, ce médicament peut modifier les capacités de réaction de manière telle que l'aptitude à participer activement à la circulation routière, à utiliser des machines ou à travailler sans appui sûr peut être altérée. Ceci est valable dans une mesure accrue au début du traitement, lors d'une augmentation posologique et d'un changement de traitement ainsi qu'en association avec l'alcool.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous présentez un asthme, des troubles respiratoires, des troubles de la respiration sanguine, des problèmes cardiaques, des affections rénales ou des affections thyroïdiennes.



Signalez à votre médecin que vous prenez d'autres médicaments par exemple disopyramide ou amiodarone destinés à corriger des irrégularités des battements cardiaques, une pression artérielle trop élevée ou une angine de poitrine ou une insuffisance cardiaque ou pour calmer des douleurs.

Parlez avec votre médecin si vous utilisez des sprays nasaux décongestionnants ou des médicaments contre refroidissement.

Si vous prenez de la clonidine en raison d'une hypertension artérielle ou de migraines, vous ne devez jamais arrêter de votre propre initiative la clonidine ou Atenolol-Mepha, sans consulter au préalable votre médecin.

Votre pouls peut se ralentir au cours du traitement. Cela est une réaction normale au principe actif. Informez-en votre médecin, si votre pouls au repos descend au-dessous de 50 battements par minute.

Si vous êtes diabétique et que votre glycémie est souvent trop basse, ou si vous prenez simultanément d'autres médicaments, en particulier pour le cœur, ne manquez pas d'en parler à votre médecin.

Sachez bien qu'avant toute intervention chirurgicale, le médecin anesthésiste doit connaître tous les médicaments que vous prenez.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé pelliculé, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication!).

Atenolol-Mepha peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Vous ne devriez, si possible, prendre aucun médicament pendant une grossesse ou l'allaitement. Cette précaution vaut également pour Atenolol-Mepha. Dans des situations particulières, votre médecin pourra décider si et quand Atenolol-Mepha est indiqué pendant une grossesse ou l'allaitement.

Comment utiliser Atenolol-Mepha?

Comme tout médicament, vous devez prendre Atenolol-Mepha en suivant strictement les prescriptions de votre médecin. En règle générale, la dose pour adulte est de 1 comprimé pelliculé d'Atenolol-Mepha 50 ou 1 comprimé pelliculé d'Atenolol-Mepha 100, 1 fois par jour. Chez les patients présentant une maladie des reins avec une excrétion insuffisante, le médecin adaptera la dose en conséquence. Avalez les comprimés pelliculés avec un peu de liquide, sans les croquer, pendant ou après un repas, de préférence toujours au même moment de la journée. Les comprimés pelliculés présentent une rainure de sécabilité et peuvent être divisés en deux pour réduire la dose de moitié. Si vous avez oublié de prendre un comprimé pelliculé, prenez-le dès que vous y pensez. Il ne faut toutefois pas prendre deux comprimés pelliculés en même temps. Une pression trop élevée et non contrôlée peut avoir de dangereuses conséquences. Il ne faut en aucun cas arrêter brusquement le traitement, mais très progressivement, sur une période prolongée. De manière à améliorer l'effet d'Atenolol-Mepha dans certaines situations, il est possible que votre médecin vous prescrive d'autres médicaments en plus. Veillez à toujours avoir une réserve suffisante de vos comprimés pelliculés d'Atenolol-Mepha, pour ne pas devoir interrompre votre traitement.

L'utilisation et la sécurité d'Atenolol-Mepha n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Atenolol-Mepha peut-il provoquer?

La prise d'Atenolol-Mepha peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)



On a rapporté fréquemment une fatigue, un ralentissement des battements cardiaques, une sensation de froid au niveau des doigts et des orteils, des nausées, des vomissements et une diarrhée.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

On peut observer occasionnellement des troubles du sommeil.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10'000)

Des hémorragies cutanées ou muqueuses minuscules (purpura), un état confusionnel, des vertiges, des maux de tête, des variations de l'humeur, des cauchemars, un état psychotique, des hallucinations, un fourmillement des mains, des troubles de la vue, une sécheresse des yeux, une aggravation des troubles de la circulation sanguine, un bloc cardiaque (les symptômes en sont des battements cardiaques irréguliers, une fatigue et des vertiges lorsqu'on passe trop rapidement à la station debout), l'aggravation d'une insuffisance cardiaque, une pression artérielle basse (qui peut être associée à une syncope), une aggravation des troubles respiratoires chez les asthmatiques, une sécheresse de la bouche, l'aggravation d'un psoriasis, des éruptions cutanées, une chute des cheveux, une impuissance et une courbure anormale de la verge sont rares.

Contactez immédiatement votre médecin, si votre pouls au repos descend au-dessous de 50 battements par minute ou si votre pression artérielle est trop basse. Comme tous les médicaments utilisés pour normaliser la fréquence des battements cardiaques, l'aténolol peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Dépression.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 25°C. Conserver hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Atenolol-Mepha?

Principes actifs

1 comprimé pelliculé d'Atenolol-Mepha 25 contient: 25 mg d'aténolol.

1 comprimé pelliculé d'Atenolol-Mepha 50 contient: 50 mg d'aténolol.

1 comprimé pelliculé d'Atenolol-Mepha 100 contient: 100 mg d'aténolol.

Excipients

Carbonate de magnésium, amidon de maïs, laurilsulfate de sodium (E487), gélatine, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose, dioxyde de titane (E171), glycérol 85% (E422).

Numéro d'autorisation

50075 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Atenolol-Mepha? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Atenolol-Mepha 25 comprimés pelliculés (avec rainure de sécabilité, sécables): emballages de 30 et 100 comprimés pelliculés.



Atenolol-Mepha 50 comprimés pelliculés (avec rainure de sécabilité, sécables): emballages de 30 et 100 comprimés pelliculés.

Atenolol-Mepha 100 comprimés pelliculés (avec rainure de sécabilité, sécables): emballages de 30 et 100 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'autorisation

Mepha Pharma AG, Basel.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Numéro de version interne: 6.1

