

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Atenolol-Mepha compresse rivestite con film

Mepha Pharma AG

Che cos'è Atenolol-Mepha e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Atenolol-Mepha protegge il cuore da stimolazioni eccessive. Il lavoro del muscolo cardiaco viene ridotto e la reazione cardiaca al carico fisico e psichico è attenuata. Atenolol-Mepha diminuisce la pressione sanguigna elevata. L'angina pectoris (forti dolori al petto con eventuale propagazione al braccio sinistro) è dovuta a una ossigenazione insufficiente del cuore sotto sforzo. Atenolol-Mepha evita gli attacchi anginosi o ne diminuisce la frequenza e il dolore. Atenolol-Mepha può normalizzare il ritmo cardiaco alterato o ridurre le pulsazioni originate da malattia o dallo stress.

L'atenololo, principio attivo del Atenolol-Mepha, appartiene ad una generazione di betabloccanti ad azione specifica sul cuore. Esso riduce la pressione sanguigna elevata e calma l'attività cardiaca senza effetti sulla muscolatura delle vie respiratorie. Pertanto, con la dovuta prudenza, anche i pazienti con malattie respiratorie (respirazione difficile, asma) possono assumere Atenolol-Mepha.

Il medico prescrive Atenolol-Mepha:

- per ridurre la pressione sanguigna elevata (ipertensione);
- per proteggere il muscolo cardiaco da sforzi eccessivi (angina pectoris);
- per curare i disturbi del ritmo cardiaco;
- dopo infarto cardiaco;
- per prevenire un infarto cardiaco ulteriore.

Quando non si può usare Atenolol-Mepha?

In caso di una delle malattie seguenti rinunci a prendere Atenolol-Mepha: se ha già avuto in precedenza una reazione allergica ad Atenolol-Mepha od al principio attivo atenololo, se soffre d'insufficienza cardiaca o blocco cardiaco (pulsazioni al disotto di 50 al minuto), nel caso Lei abbia avuto un polso molto lento o molto irregolare, una pressione arteriosa molto bassa o molto cattiva irrorazione sanguigna, se in Lei è stata constatata la presenza di un feocromocitoma o dopo un digiuno prolungato.

Atenolol-Mepha non è adatto ai bambini.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Atenolol-Mepha?

Il trattamento con questo medicamento richiede controlli medici regolari. A causa della variabilità individuale delle reazioni, la capacità di reazione può essere alterata al punto da compromettere la capacità di partecipare attivamente al traffico stradale, utilizzare macchine o lavorare in posizione instabile. Questo in misura maggiore all'inizio del trattamento, in caso di aumento della dose e cambio di terapia e in combinazione con alcol.

Informi il medico o il farmacista se soffre di asma, disturbi respiratori, disturbi dell'irrorazione sanguigna, problemi al cuore, malattie dei reni o della tiroide.

Comunichi al medico se usa altri medicinali quali, ad esempio disopiramide o amiodarone contro un polso irregolare, l'ipertensione o l'angina pectoris, l'insufficienza cardiaca o contro i dolori.

Parli col medico se usa degli spray nasali decongestionanti o dei medicinali contro le infreddature.



Se assume clonidina per la terapia di ipertensione o di emicrania, non deve sospendere né la clonidina né Atenolol-Mepha senza averne prima parlato con il Suo medico.

Il suo polso si può rallentare durante il trattamento. Questa è una reazione normale al principio attivo. Avverta il medico se le pulsazioni, a riposo, scendono al disotto di 50 al minuto.

Chieda consiglio al medico in caso di diabete, glicemia sovente troppo bassa, o se assume contemporaneamente altri farmaci (e in particolare farmaci per il cuore).

Prima d'intervento chirurgico si devono elencare al medico anestesista i farmaci assunti.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita con film, cioè è essenzialmente «senza sodio».

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Atenolol-Mepha durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza o l'allattamento è opportuno evitare ogni farmaco e questa norma prudenziale vale anche per Atenolol-Mepha. In casi particolari il medico deciderà se e quando Atenolol-Mepha va assunto durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Atenolol-Mepha?

Come ogni farmaco, Atenolol-Mepha si assume attenendosi strettamente alla prescrizione medica. Generalmente la dose per l'adulto è di 1 compressa rivestita con film al giorno di Atenolol-Mepha 50 o 1 compressa rivestita con film al giorno di Atenolol-Mepha 100. Il medico adatterà la dose ai pazienti con malattia renale e turbe dell'eliminazione. Ingerire la compressa rivestita con film con un poco di liquido, senza masticarla, di preferenza sempre alla stessa ora, durante o dopo i pasti. Le compresse rivestite con film presentano una linea di frattura e possono essere suddivise per dimezzare la dose. Se una volta ha dimenticato di assumere una compressa rivestita con film, la prenda appena se ne ricorda. Tuttavia, non si devono prendere due compresse rivestite con film contemporaneamente. La pressione sanguigna troppo alta può avere conseguenze gravi. Evitare in ogni caso di interrompere la cura bruscamente e farlo gradualmente. Per rafforzare l'effetto di Atenolol-Mepha il medico può aggiungere un altro farmaco. Per evitare di interrompere la cura ci si accerti di avere sempre una scorta adeguata di Atenolol-Mepha compresse rivestite con film.

L'uso e la sicurezza di Atenolol-Mepha nei bambini e negli adolescenti non sono stati esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Atenolol-Mepha?

Con l'assunzione o l'applicazione di Atenolol-Mepha possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

Spesso sono stati riferiti stanchezza, rallentamento del battito cardiaco, sensazione di freddo nelle dita delle mani e dei piedi, nausea, vomito e diarrea.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Occasionalmente possono manifestarsi dei disturbi del sonno.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Rari sono piccole emorragie nella pelle o nelle mucose (porpora), confusione, vertigini, mal di testa, cambiamenti d'umore, incubi, psicosi, allucinazioni, formicolio alle mani, disturbi della vista, «occhi secchi», aggravamento di disturbi dell'irrorazione sanguigna, blocco cardiaco (ne sono sintomi battito cardiaco



irregolare, stanchezza e vertigini alzandosi troppo rapidamente), peggioramento di un'insufficienza cardiaca, pressione sanguigna bassa (ipotensione, che può essere associata a perdita di coscienza), peggioramento dei disturbi respiratori negli asmatici, secchezza della bocca, aggravamento di una psoriasi, eruzioni sulla pelle, caduta dei capelli, impotenza e curvatura del pene.

Avverta immediatamente il medico se le pulsazioni, a riposo, scendono al di sotto di 50 al minuto o se la pressione sanguigna è troppo bassa.

Come tutti i farmaci regolatori della frequenza cardiaca, anche l'atenololo può determinare alterazioni del ritmo cardiaco.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Depressione.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Conservare nella confezione originale, al riparo dalla luce e a temperature non superiori a 25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Atenolol-Mepha?

Principi attivi

1 compressa rivestita con film di Atenolol-Mepha 25 contiene: atenololo 25 mg.

1 compressa rivestita con film di Atenolol-Mepha 50 contiene: atenololo 50 mg.

1 compressa rivestita con film di Atenolol-Mepha 100 contiene: atenololo 100 mg.

Sostanze ausiliarie

Magnesio carbonato, amido di mais, sodio laurilsolfato (E487), gelatina, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, titanio diossido (E171), glicerolo 85 per cento (E422).

Numero dell'omologazione

50075 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Atenolol-Mepha? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Atenolol-Mepha 25 compresse rivestite con film (con linea di frattura, divisibili): confezioni da 30 e 100 compresse rivestite con film.

Atenolol-Mepha 50 compresse rivestite con film (con linea di frattura, divisibili): confezioni da 30 e 100 compresse rivestite con film.

Atenolol-Mepha 100 compresse rivestite con film (con linea di frattura, divisibili): confezioni da 30 e 100 compresse rivestite con film.

Titolare dell'omologazione

Mepha Pharma AG, Basel.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2023 dall' autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Numero interno della versione: 6.1

