

## Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## Dentinox<sup>®</sup>, Gel

### Che cos'è il Dentinox<sup>®</sup> e quando si usa?

Dentinox<sup>®</sup> è un gel gengivale utile in caso di irritazione e gonfiore delle gengive. Il gel allevia il dolore nel punto di eruzione del dente. Oltre ad una tintura di camomilla, il Dentinox<sup>®</sup> contiene altre due sostanze ad azione analgesica locale.

### Quando non si può usare il Dentinox<sup>®</sup>?

Non utilizzi questo prodotto se il bambino è ipersensibile alla camomilla, ad altre composite, alla lidocaina, agli anestetici applicati localmente (anestetici locali di tipo amidico) o a un altro componente del preparato.

### Quando è richiesta prudenza nell'uso di Dentinox<sup>®</sup>?

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Questo medicamento contiene 150 mg di propilene glicole per 1 g gel.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso il bambino:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

### Si può usare il Dentinox<sup>®</sup> durante la gravidanza o l'allattamento?

Il Dentinox<sup>®</sup> non è destinato agli adulti.

### Come usare il Dentinox<sup>®</sup>?

Eccetto se prescritto diversamente: alla comparsa di disturbi della dentizione applicare con un dito pulito o con un bastoncino ovattato un po' di Dentinox<sup>®</sup> della dimensione di un pisello sulla zona dove sta spuntando un dente, e massaggiare delicatamente.

Il trattamento va ripetuto dopo ogni pasto del bambino e prima di andare a letto fino ad un massimo di 6 volte nelle 24 ore, e può essere continuato fino alla comparsa di tutti i denti da latte. Lo stesso vale per la comparsa dei molari.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo



droghiere.

### **Quali effetti collaterali può avere il Dentinox®?**

Con l'applicazione del Dentinox® possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

*Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)*

Reazioni allergiche.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

### **Di che altro occorre tener conto?**

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. **Conservare fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15-25°C).**

### **Cosa contiene il Dentinox®?**

1 grammo di Dentinox® contiene:

#### *Principi attivi*

Tintura di camomilla (1:5) 150 mg, lidocaina cloridrato monoidrato 3,4 mg, Macrogol 9 laurile etere 3,2 mg.

#### *Sostanze ausiliarie*

Glicole propilenico (E 1520) 150 mg, etanolo 70%, xilitolo (E 967), sorbitolo liquido 70% (non cristallizzabile) (E 420), sodio edetato, carbomeri 974 P, sodio idrossido, polisorbato 20, saccarina sodica (E 954), levomentolo, acqua depurata.

### **Numero dell'omologazione**

42669 (Swissmedic)

### **Dove è ottenibile il Dentinox®? Quali confezioni sono disponibili?**

Disponibile solo per la vendita all'estero.

### **Titolare dell'omologazione**

Tapadar GmbH, 5600 Lenzburg

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

