

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Viburcol, Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Viburcol angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Viburcol bei Unruhezuständen und Reizbarkeit bei Kindern ab 2 Jahren mit oder ohne Fieber (z.B. beim Zahnen, leichten Bauchschmerzen, Schlaflosigkeit) sowie bei banalen Infekten angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin Ihrem Kind andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Viburcol gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Viburcol nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Bitte wenden Sie Viburcol erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt resp. Ärztin an, wenn Ihnen bekannt ist, dass ihr Kind unter einer Zuckerunverträglichkeit leidet.

Viburcol soll nicht länger als 3 Tage eingenommen werden. Sollten die Beschwerden weiterhin anhalten oder sich verschlimmern, ist ein Arzt resp. eine Ärztin aufzusuchen.

Viburcol darf bei Kleinkindern unter 2 Jahren nicht angewendet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn ihr Kind

- an anderen Krankheiten leidet,
- Allergien hat oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnimmt oder äusserlich anwendet!

Darf Viburcol während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Nicht zutreffend.

Wie verwenden Sie Viburcol?

Falls vom Arzt oder Ärztin nicht anders verschrieben, beträgt die empfohlene Dosis:

Kinder von 6 bis 11 Jahren:



2-mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden: alle 1 bis 2 Stunden bis zu 8-mal täglich 1 Tablette. Die Weiterbehandlung erfolgt mit der Standarddosierung.

Kinder von 2 bis 5 Jahren:

1 bis 2-mal täglich 1 Tablette. Die Tablette zerkleinern und in Wasser vollständig gelöst verabreichen. Bei akuten Beschwerden: alle 1 bis 2 Stunden bis zu 6-mal täglich 1 Tablette. Die Weiterbehandlung erfolgt mit der Standarddosierung.

Die Einnahme erfolgt mit Abstand zu den Mahlzeiten.

Viburcol soll nicht länger als 3 Tage eingenommen werden. Sollten die Beschwerden weiterhin anhalten oder sich verschlimmern, ist ein Arzt resp. eine Ärztin aufzusuchen.

Viburcol darf bei Kleinkindern unter 2 Jahren nicht angewendet werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Viburcol haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Viburcol ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Für Viburcol sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "verwendbar bis" bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Nicht über 30°C lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Viburcol enthalten?

1 Tablette (301,5 mg) enthält:

Wirkstoffe

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 11,0 mg

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D8 75,0 mg

Matricaria recutita (HAB) D4 25,0 mg

Plantago major (HAB) D4 25,0 mg



Pulsatilla pratensis (HAB) D6 50,0 mg
Solanum dulcamara (HAB) D6 25,0 mg

Hilfsstoffe

Lactose-Monohydrat 300 mg, Magnesiumstearat

Zulassungsnummer

69741 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Viburcol? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packung zu 50 Tabletten.

ZulassungsinhaberIn

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

HerstellerIn

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Diese Packungsbeilage wurde im Januar 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

