

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, conformément aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Viburcol, comprimés

Médicament homéopathique

Quand Viburcol est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Viburcol peut être utilisé en cas d'états d'agitation et d'irritabilité, avec ou sans fièvre, chez les enfants à partir de 2 ans (par exemple, lors de poussées dentaires, de coliques intestinales légères ou d'insomnie) ainsi que lors d'infections banales.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Viburcol peut être pris simultanément.

Quand Viburcol ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Le médicament ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants.

Veuillez n'utiliser Viburcol qu'après avoir consulté votre médecin si vous savez que votre enfant souffre d'une intolérance au sucre.

Viburcol ne doit pas être pris pendant plus de 3 jours. Si les plaintes persistent ou s'aggravent, consultez un médecin. Viburcol ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 2 ans.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si votre enfant

- souffre d'autres maladies,
- a des allergies, ou
- prend ou applique d'autres médicaments (y compris ceux achetés en automédication!)

Viburcol peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Non pertinent.

Comment utiliser Viburcol?

Sauf prescription contraire de votre médecin, le dosage recommandé est le suivant:

Enfants de 6 à 11 ans:

Laisser fondre 1 comprimé dans la bouche deux fois par jour. Lors de symptômes aigus: 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures jusqu'à 8 fois par jour. La suite du traitement est effectuée avec le dosage standard.

Enfants de 2 à 5 ans:



1 comprimé 1 à 2 fois par jour. Écraser le comprimé et l'administrer complètement dissous dans de l'eau. Lors de symptômes aigus: 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures jusqu'à 6 fois par jour. La suite du traitement est effectuée avec le dosage standard.

Le médicament doit être pris à distance des repas.

Viburcol ne doit pas être pris pendant plus de 3 jours. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un médecin.

Viburcol ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 2 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Viburcol peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Viburcol et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire avec le Viburcol n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Viburcol?

1 comprimé (301,5 mg) contient:

Principes actifs

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 11,0 mg

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D8 75,0 mg

Matricaria recutita (HAB) D4 25,0 mg

Plantago major (HAB) D4 25,0 mg

Pulsatilla pratensis (HAB) D6 50,0 mg

Solanum dulcamara (HAB) D6 25,0 mg

Excipients

Lactose monohydraté 300 mg, magnésium stéarate.



Numéro d'autorisation

69741 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Viburcol? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 50 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

