

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Viburcol, compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Viburcol?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Viburcol può essere usato in caso di irrequietezza e irritabilità nei bambini a partire dai 2 anni di età, con o senza febbre (ad esempio dentizione, lieve dolore addominale, insonnia), nonché per infezioni banali.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può assumere Viburcol.

Quando non si può assumere Viburcol e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Il medicamento non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità nota contro uno degli ingredienti. Se si sa che il proprio bambino soffre di intolleranza allo zucchero, utilizzare Viburcol solo dopo aver consultato il medico.

Viburcol non deve essere assunto per più di tre giorni. Se i sintomi persistono o peggiorano, è necessario consultare un medico.

Viburcol non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ai 2 anni.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere se il suo bambino

- soffre di altre malattie
- ha allergie o
- sta assumendo o applicando altri farmaci (anche quelli acquistati da te!)

Si può assumere Viburcol durante la gravidanza o l'allattamento?

Non idoneo

Come usare Viburcol?

Salvo diversa prescrizione medica, la dose raccomandata è:

Bambini dai 6 agli 11 anni:

Sciogliere in bocca 1 compressa due volte al giorno.

Per sintomi acuti: 1 compressa ogni 1-2 ore, fino a 8 volte al giorno. Il trattamento successivo viene effettuato con il dosaggio standard.

Bambini dai 2 ai 5 anni:



1 compressa da 1 a 2 volte al giorno. Polverizzare la compressa e somministrarla completamente sciolta in acqua.

Per sintomi acuti: 1 compressa ogni 1-2 ore, fino a 6 volte al giorno. Il trattamento successivo viene effettuato con il dosaggio standard.

Il medicamento deve essere assunto lontano dai pasti.

Viburcol non deve essere assunto per più di 3 giorni. Se i sintomi persistono o peggiorano, consultare un medico.

Viburcol non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ai 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Viburcol?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Viburcol e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Viburcol.

Se si osservano eventuali effetti collaterali è importante informare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30°C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Viburcol?

1 compressa (301,5 mg) contiene:

Principi attivi

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 11,0 mg

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D8 75,0 mg

Matricaria recutita (HAB) D4 25,0 mg

Plantago major (HAB) D4 25,0 mg

Pulsatilla pratensis (HAB) D6 50,0 mg

Solanum dulcamara (HAB) D6 25,0 mg

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 300 mg, stearato di magnesio

Numero dell'omologazione



69741 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Viburcol? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 compresse.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

