

Regenaplex Nr. 88b Gouttes

Médicament homéopathique

Quand Regenaplex Nr. 88b est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Regenaplex Nr. 88b peut être utilisé en cas d'incontinence urinaire accompagné d'énurésie nocturne.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Regenaplex Nr. 88b peut être pris simultanément.

Quand Regenaplex Nr. 88b ne doit-il pas être pris/utilisé ou seulement avec précaution?

L'incontinence urinaire peut avoir beaucoup de causes. Ces troubles peuvent être déclenchés par des refroidissements, de la nervosité ou des conflits psychiques. Lors de troubles récidivants ou persistant pendant plusieurs jours et en cas de fièvre, il faut consulter un médecin.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne (même en automédication)!

Regenaplex Nr. 88b peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée.

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien.

Comment utiliser Regenaplex Nr. 88b?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes: 1–2 fois par jour 8–10 gouttes.

Enfants plus de 6 ans: 1–2 fois par jour 1–5 gouttes.

Posologie/mode d'emploi: Donner les gouttes directement sur la langue ou diluées dans un peu d'eau (Pour les enfants toujours diluer avec de l'eau). Garder les gouttes à peu près une minute dans la bouche avant de les avaler. Ne rien manger ni boire 15 minutes avant et après la prise du médicament.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Regenaplex Nr. 88b peut-il provoquer?

L'emploi approprié du médicament Regenaplex Nr. 88b n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Regenaplex Nr. 88b et informez-en votre médecin, votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Conserver hors de portée des enfants.

Les gouttes sont à conserver à température ambiante (15–25 °C).

Les gouttes contiennent 50 vol.-% d'alcool.

Que contient Regenaplex Nr. 88b?

10,0 ml contiennent respectivement 1,25 ml de: Acidum silicicum D 12, Argentum nitricum D 30, Arnica montana D 6, Aurum metallicum D 30, Calcium carbonicum Hahnemanni D 12, Magnesium carbonicum D 10, Stillingia silvatica D 4, Symphytum officinale D 6.

Les gouttes contiennent 50 vol.-% d'alcool.

Numéro d'autorisation

36698 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Regenaplex Nr. 88b? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sans ordonnance médicale.

Contenance: 15 ml.

Titulaire de l'autorisation

REGENA AG, Tägerwil.

Fabricant

REGENA AG, Tägerwil.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en **novembre 2011** par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

