

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Similasan Maux de voyage, globules

Médicament homéopathique

Quand Similasan Maux de voyage est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, Similasan Maux de voyage peut être utilisé en cas de mal des transports (voiture, avion, bateau, train, etc.) avec des symptômes tels que nausées, vomissements et vertiges.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Similasan Maux de voyage peut être pris/utilisé simultanément.

Quand Similasan Maux de voyage ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Similasan Maux de voyage ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 2 ans.

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien (ou votre droguiste*) si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe¹) (même en automédication !).

Comment utiliser Similasan Maux de voyage?

Similasan Maux de voyage ne doit être administré aux enfants de moins de deux ans que sur prescription médicale.

Sauf prescription contraire du médecin.

Enfants à partir de 2 ans, adolescents et adultes: 7 globules (granules) par prise.

Le jour du voyage: 1 à 3 prises avant le départ. Pendant le voyage, selon l'état général, 1 prise plusieurs fois par jour (jusqu'à une fois toutes les demi-heures).

Dosage maximal: 7 globules 10 fois par jour.

Indications de prise:

- Laisser fondre les globules (granules) sous la langue avant d'avaler.



- Les globules peuvent être dissous dans un verre d'eau et bus par les enfants à partir de 2 ans.
- Ils peuvent également être pris à jeun.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Similasan Maux de voyage peut-il provoquer?

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Similasan Maux de voyage et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Similasan Maux de voyage n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Similasan Maux de voyage?

1 g de globules (70-90 globules) contient:

Principes actifs

Strychnos nux-vomica (HAB) D15 (Ph.Eur.Hom. 1.1.8) 2,50 mg, Hyoscyamus niger (HAB) D15 2,50 mg, Petroleum rectificatum (HAB) D15 2,50 mg, Anamirta cocculus (HAB) D15 (Ph.Eur.Hom. 1.1.8) 2,50 mg.

Excipients

Carbonate de calcium; xylitol

Numéro d'autorisation

67812 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Similasan Maux de voyage? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?



En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Taille d'emballage: 15 g

4,5 g

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

