

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Lyman® 40'000 Mono Spray

Drossapharm AG

Che cos'è Lyman 40'000 Mono Spray e quando si usa?

Lyman 40'000 Mono Spray contiene eparina ed è un medicamento per uso esterno.

L'eparina contenuta nel preparato ha un effetto anticoagulante e antinfiammatorio. Il suo principio attivo favorisce il riassorbimento degli ematomi superficiali, contribuendo di conseguenza a rilassare i tessuti e ad alleviare il dolore legato alla tensione. Lyman 40'000 Mono Spray è indicato:

- in caso di disturbi legati alle vene varicose quali dolore, sensazione di pesantezza e gambe gonfie (edema da stasi);
- in caso di lesioni contudenti da sport e infortunio quali lividi, contusioni, tumefazioni, stiramenti ed ematomi.
- in caso di dolori ai muscoli e ai tendini;
- per l'ammorbidimento delle cicatrici indurite, la cura e il miglioramento estetico delle cicatrici.

Lyman 40'000 Mono Spray può essere usato su prescrizione medica anche in caso di processi infiammatori e trombotici superficiali.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Segua i consigli del suo medico, non soltanto per la posologia corretta ma anche per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività fisica o l'uso di calze a compressione, ecc.

Lyman 40'000 Mono Spray non contiene componenti grassi né intacca le calze elastiche a compressione.

Quando non si può usare Lyman 40'000 Mono Spray?

Lyman 40'000 Mono Spray non deve essere usato in caso di ipersensibilità al principio attivo o una qualsiasi delle sostanze ausiliarie. Lyman 40'000 Mono Spray non deve essere usato in presenza di una maggiore tendenza all'emorragia. Lyman 40'000 Mono Spray non deve essere usato in caso di nota trombocitopenia indotta da eparina (HIT, carenza di piastrine provocata da eparina).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lyman 40'000 Mono Spray?



Evitare il contatto con gli occhi. Applicare il prodotto solo sulla pelle intatta, evitando le mucose e le ferite aperte. In caso di patologie venose dovute alla presenza di un coagulo di sangue (cosiddetta trombosi) non applicare il prodotto tramite massaggio. Se i sintomi persistono o peggiorano, consultare un medico.

Poiché Lyman 40'000 Mono Spray contiene eparina, non si può escludere completamente un'interazione con medicinali che inibiscono la coagulazione del sangue (tra questi figurano non solo medicinali per la fluidificazione del sangue ma anche molti antidolorifici e antireumatici). Tuttavia, se Lyman 40'000 Mono Spray è usato correttamente, un aumento del rischio di sanguinamento è improbabile perché l'eparina non entra quasi mai in circolo. Chieda consiglio al suo medico in caso di uso concomitante di Lyman 40'000 Mono Spray con uno qualsiasi dei medicinali summenzionati.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffra di altre malattie
- soffra di allergie o
- assuma altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applichi esternamente.

Si può usare Lyman 40'000 Mono Spray durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Lyman 40'000 Mono Spray?

Adulti: salvo diversa prescrizione medica, spruzzare il prodotto più volte al giorno (il numero di spruzzi necessari varia a seconda dell'area da trattare; di solito bastano 5-7 spruzzi) sulle aree cutanee intatte da trattare. Spruzzare Lyman 40'000 Mono Spray in modo che una pellicola continua di liquido copra la zona da trattare. Lo spray è progettato in modo da funzionare anche quando l'ugello è rivolto verso il basso (ad es. per l'applicazione sui polpacci).

Il periodo di utilizzo non è limitato; tuttavia, si raccomanda di consultare un medico se i sintomi persistono o peggiorano.

Bambini e adolescenti: l'uso e la sicurezza di Lyman 40'000 Mono Spray nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Lyman 40'000 Mono Spray?

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000): i pazienti ipersensibili possono sviluppare un'allergia. In tali casi è necessario interrompere il trattamento.



Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Conservare fuori dalla portata dei bambini, a temperatura ambiente (15°C-25°C) e nella confezione originale.

Il medico, il farmacista o il droghiere che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Lyman 40'000 Mono Spray?

1 ml di Lyman 40'000 Mono Spray contiene:

Principio attivo: 400 U.I. di eparina

Sostanze ausiliarie: alcool isopropilico, glicerolo 85%, fenossietanolo, carbomer 980, trometamolo, acqua purificata

Numero dell'omologazione

55744 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Lyman 40'000 Mono Spray? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Lyman 40'000 Mono Spray: flacone da 100 ml

Titolare dell'omologazione

Drossapharm AG, Basilea

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel **marzo 2021** dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

