

KETAZED

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que KETAZED et quand doit-il être utilisé ?

Selon prescription du médecin.

KETAZED, collyre en solution contient la substance active «kétotifène», qui est une molécule anti-allergique.

KETAZED, collyre en solution est préconisé dans le traitement symptomatique de la conjonctivite allergique saisonnière.

Quand KETAZED ne doit-il pas être pris/utilisé ?

N'utilisez jamais KETAZED:

- si vous êtes allergique au kétotifène ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « Que contient KETAZED ? »).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de KETAZED ?

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser KETAZED, collyre en solution.

Prise concomitante de KETAZED et d'autres médicaments

Si vous devez utiliser un autre collyre en même temps, que ce médicament, attendez au moins 5 minutes entre les deux instillations.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez des médicaments pour traiter:

- la dépression, l'anxiété et des troubles du sommeil
- l'allergie (ex. antihistaminiques)

Prise concomitante de KETAZED et d'aliments, des boissons et de l'alcool

L'utilisation de ce médicament peut augmenter l'effet de l'alcool.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament peut causer une vision trouble ou une somnolence. Si vous présentez ces symptômes, vous devez attendre leur disparition avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.



Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe¹) (même en automédication !).

KETAZED peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Comment utiliser KETAZED ?


Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Chez les adultes, les personnes âgées et les enfants (âgés d'au moins 3 ans), la dose recommandée est d'une goutte dans l'œil/les yeux atteint(s), deux fois par jour (matin et soir).

L'utilisation et la sécurité de KETAZED, collyre en solution n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants âgés de moins de 3 ans.

Instructions d'utilisation



1a 	• Sortez le flacon multidose en plastique de la boîte en carton (image 1a) et écrivez la date d'ouverture du flacon sur la boîte en carton, à l'endroit prévu.
1b 	• Lavez soigneusement vos mains avant d'ouvrir le flacon. • Enlevez le capuchon (image 1b).
2 	• Tenez le flacon à l'envers, avec le pouce sur le rebord du flacon et les autres doigts sur le fond du flacon. Avant la première utilisation, actionnez la pompe à plusieurs reprises, environ 20 fois, jusqu'à l'obtention d'un flux constant du produit (image 2).
3 	• Inclinez votre tête ou la tête de votre enfant vers l'arrière. À l'aide d'un doigt propre, tirez la paupière vers le bas jusqu'à l'apparition d'une « poche » entre la paupière et l'œil. Appliquez la goutte à cet endroit (image 3). • Approchez l'embout du flacon près de l'œil. Utilisez le miroir si vous en avez besoin.
4 	• Ne touchez pas l'œil ni la paupière, ni les zones environnantes ou d'autres surfaces avec l'embout du flacon. Cela pourrait infecter la solution. • Appuyez doucement sur le fond du flacon pour libérer une goutte de médicament à la fois (image 4).



5 	• Si une goutte tombe à côté de l'œil, recommencez l'application. • Après avoir utilisé le médicament, pressez le coin de l'œil à l'aide d'un doigt, du côté du nez (image 5). Cela permet d'empêcher la pénétration du médicament dans le reste du corps.
1-5	• Si vous devez traiter les deux yeux, répétez les mêmes étapes (1 à 5) pour l'autre œil. • Refermez le flacon à l'aide du capuchon immédiatement après l'utilisation. • N'utilisez qu'un flacon de médicament à la fois. N'enlevez le capuchon du flacon qu'au moment où vous avez besoin d'utiliser le médicament. • Vous devez jeter le flacon 3 mois après la première ouverture (en vérifiant la date de l'ouverture inscrite sur la boîte en carton), et utiliser un nouveau flacon.

Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de Ketazed que vous auriez dû

Il n'y a aucun danger si vous avez utilisé plus d'une goutte dans l'œil ou si vous avez avalé accidentellement ce médicament. Si vous avez le moindre doute, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Si vous avez oublié d'utiliser ou prendre Ketazed

Si vous avez oublié d'utiliser ce médicament, vous devez instiller une goutte de collyre dès que vous vous en rendez compte à la posologie recommandée (1 goutte par œil, deux fois par jour). N'instillez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires KETAZED peut-il provoquer ?

Comme tous les médicaments, Ketazed peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été signalés :

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

- irritation ou douleur dans l'œil
- inflammation de l'œil

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)



- vision trouble au moment de l'application des gouttes dans l'œil
- sécheresse oculaire
- irritation des paupières
- conjonctivite
- augmentation de la sensibilité des yeux à la lumière
- saignement visible dans le blanc de l'œil
- maux de tête
- somnolence
- éruption cutanée (avec éventuellement des démangeaisons)
- eczéma (éruption avec rougeur, démangeaisons et sensation de brûlure)
- sécheresse buccale

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- réaction allergique (incluant un gonflement du visage et des paupières) et aggravation d'états allergiques existants tels que l'asthme ou un eczéma
-

Si l'un des effets indésirables devient grave, veuillez avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient. La date d'expiration correspond au dernier jour du mois indiqué.

Délai d'utilisation après ouverture

Après son ouverture, le flacon peut se conserver pendant maximum 3 mois.

Ne jetez aucun médicament dans les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25°C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien comment éliminer le médicament si vous ne l'utilisez plus. Vous contribuerez ainsi à protéger l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.



Que contient KETAZED ?

KETAZED est présenté sous forme d'une solution claire, incolore à légèrement colorée en jaune. La solution est contenue dans un flacon en plastique blanc muni d'une pompe. Chaque flacon contient 10 ml de solution.

Principes actifs

La substance active est Kétotifène (sous forme de kétotifène).

1 ml de collyre en solution contient 0,25 mg de kétotifène (sous forme de kétotifène 0.345 mg).

Excipients

Les autres composants sont: hyaluronate de sodium, glycérol (E 422), hydroxyde de sodium (E 524) pour l'ajustement du pH, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

69003 (Swissmedic)

Où obtenez-vous KETAZED ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

1 Flacon de 10 ml.

Titulaire de l'autorisation

Horus Pharma Suisse SA, 1260 Nyon

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

