

BIODORON® 5%, Comprimés

Médicament anthroposophique

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand Biodoron 5% est-il utilisé?

Selon la connaissance anthroposophique de l'être humain et de la nature, Biodoron 5% peut être utilisé lors de migraine, principalement classique, dans son traitement de base (ou intermittent) ou lors de crise, de même que lors de maux de tête d'origine vasomotrice (céphalées migraineuses).

Biodoron 5% exerce par ses trois composants fer, soufre et quartz un effet stabilisant sur les fonctions végétatives et diminue la fréquence des crises de migraine.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si Biodoron 5% peut être pris simultanément.

Quand Biodoron 5% ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

L'utilisation et la sécurité de Biodoron 5% chez les enfants de moins de 6 ans n'a pas fait l'objet d'études et ce médicament n'est donc pas recommandé dans cette tranche d'âge.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants ainsi que chez les enfants de moins de 1 an. Les patients à l'estomac sensible doivent consommer Biodoron 5% avec précaution.

Les médicaments contenant du fer sont susceptibles de réduire l'effet de certains antibiotiques (tétracyclines).

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne (même en automédication!).

Biodoron 5% peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée.

Puisque pendant la grossesse les besoins en fer sont plus élevés et l'administration de médicaments contenant du fer éventuellement nécessaire, et parce que Biodoron 5% est une préparation à base de fer,



ce médicament peut aussi être pris pour la prophylaxie ou lors de crise de migraine pendant la grossesse et l'allaitement. Par contre Biodoron 5% ne peut pas remplacer une substitution nécessaire en fer, car la teneur en fer est relativement basse.

Comment utiliser Biodoron 5%?

Sauf prescription contraire du médecin, adultes et enfants (à partir de 6 ans) prennent Biodoron 5% comme suit:

Traitement intermittent de la migraine (prophylactique): 1 comprimé 2–3 fois par jour (matin et soir, éventuellement à midi) avant le repas.

En cas de menace de crise de migraine ou pendant la crise: 1–3 comprimés plusieurs fois par jour (éventuellement toutes les heures).

Prendre les comprimés sans les mâcher et avec de l'eau. Éviter de boire du thé noir ou du café une demi-heure avant et après la prise de Biodoron 5% (à cause de leur haute teneur en tannin).

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée chez l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Biodoron 5% peut-il provoquer?

En cas de sensibilité gastrique la prise de Biodoron 5% peut, dans des rares cas, provoquer une sensation de pression au niveau de l'estomac (lourdeur) ou de nausées.

Si Biodoron 5% est mâché, un goût métallique peut se développer dans la bouche (du fait de la teneur en fer) et une coloration des dents peut apparaître.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Si les symptômes persistent ou si aucune amélioration ne se présente, cessez le traitement avec Biodoron 5% et contactez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Biodoron 5% peut présenter des taches légèrement brunes, ce qui n'altère cependant pas son efficacité.

Conserver hors de portée des enfants et à température ambiante (15–25°C). Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Que contient Biodoron 5%?

1 comprimé à 200mg contient: 20mg de Ferrum-Quarz 50% [Ferrum sulfuricum (praep. e Siderit) / Quarz].

Adjuvants: lactose, amidon de blé, béhenate de calcium.

Numéro d'autorisation

21521 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Biodoron 5%? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En vente en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.



Flacons en verre à 250 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Weleda SA, Arlesheim, Suisse

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2017 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

26053200 / 7

