

## **Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

## **neo-angin® Dolo Orange, Lutschtabletten**

**Doetsch Grether AG**

### **Was ist neo-angin dolo orange und wann wird es angewendet?**

neo-angin dolo orange Lutschtabletten enthalten den Wirkstoff Flurbiprofen. neo-angin dolo orange eignet sich zur Kurzzeitbehandlung, d.h. zur maximal 3 Tage dauernden Behandlung von schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut.

Eine Wirkung wurde etwa 30-40 min nach der Anwendung beobachtet.

### **Was sollte dazu beachtet werden?**

neo-angin dolo orange, Lutschtabletten enthalten 2.5 g verwertbare Kohlenhydrate pro Lutschtablette und sind für Diabetiker geeignet.

### **Wann darf neo-angin dolo orange nicht eingenommen werden?**

- ⌘• Wenn Sie überempfindlich sind gegenüber dem Wirkstoff Flurbiprofen oder gegenüber anderen Entzündungshemmern (Rheumamittel), Schmerz- oder Fiebermitteln (z.B. Acetylsalicylsäure, Aspirin). Eine solche Überempfindlichkeit äussert sich z.B. durch Asthma, Atemnot, Kreislaufbeschwerden, Schwellungen der Haut und Schleimhäute oder Hautausschläge (Nesselfieber).
- ⌘• Wenn Sie schwanger sind oder stillen (siehe auch Kapitel «Darf neo-angin dolo orange während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?»).
- ⌘• Wenn Sie an einem Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür leiden oder Magen-Darm-Blutungen haben.
- ⌘• Bei Kindern unter 12 Jahren. neo-angin dolo orange wurde für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht geprüft.
- ⌘• Wenn Sie unter Blutungs-, Blutbildungs- oder Blutgerinnungsstörungen leiden.
- ⌘• Bei Herz-, schwerer Nieren- oder Leberschwäche.
- ⌘• Wenn Sie an einer Intoleranz gegenüber gewissen Zuckerarten leiden.

### **Wann ist bei der Einnahme von neo-angin dolo orange Vorsicht geboten?**

In folgenden Situationen dürfen Sie neo-angin dolo orange nur auf ärztliche Verschreibung und unter ärztlicher Überwachung einnehmen:

- ⌘• wenn Sie an Asthma leiden;
- ⌘• wenn Sie früher an einem Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür erkrankt sind;
- ⌘• wenn Sie ein Nierenleiden oder ein Leberleiden haben;
- ⌘• wenn Sie wegen einer Herzkrankheit, besonders wegen Herzschwäche oder Bluthochdruck, behandelt werden;
- ⌘• wenn Sie mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Blutverdünner, Antikoagulantien) behandelt werden oder an einer Störung der Blutgerinnung leiden;
- ⌘• wenn Sie Rheumamittel oder andere Schmerzmittel (z.B. Acetylsalicylsäure, Aspirin) einnehmen;



• wenn Sie an einer chronischen Autoimmunerkrankung leiden wie systemischer Lupus erythematodes (SLE) oder Mischkollagenose;

• wenn Sie älter sind, da bei Ihnen mit grösserer Wahrscheinlichkeit Nebenwirkungen, die in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, auftreten können.

Bei der Anwendung von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR), zu denen auch neo-angin dolo gehört, wurde über Schmerzen im Brustkorb berichtet, die ein Anzeichen für eine möglicherweise schwere allergische Reaktion sein können, die Kounis-Syndrom genannt wird.

#### *Hilfsstoffe*

neo-angin dolo orange enthält einen Aromastoff mit Allergenen (Citral, Citronellol und D-Limonen). Allergene können allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei Patientinnen und Patienten, welche überempfindlich auf Azofarbstoffe reagieren, kann neo-angin dolo orange allergische Reaktionen hervorrufen.

neo-angin dolo orange enthält Isomalt und Maltitol. Bitte nehmen Sie neo-angin dolo orange erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Der Kalorienwert beträgt 2.3 kcal/g Isomalt und Maltitol. neo-angin dolo orange Lutschtabletten können eine leicht abführende Wirkung haben.

Brechen Sie die Anwendung der Lutschtabletten bei den ersten Anzeichen von Hautreaktionen (Hautausschlag, Schälen der Haut, Blasenbildung) oder anderen Anzeichen einer allergischen Reaktion ab und suchen Sie unverzüglich einen Arzt oder eine Ärztin auf. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin bei ungewöhnlichen Symptomen im Bauch (vor allem Blutungen).

Verschlechtern sich die Beschwerden oder treten neue Beschwerden auf (z.B. Fieber, Schluckbeschwerden) muss ein Arzt bzw. eine Ärztin aufgesucht werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) anwenden!

#### ***Darf neo-angin dolo orange während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?***

Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf neo-angin dolo orange nicht eingenommen werden, ausser auf ausdrückliche ärztliche Verschreibung. **Wichtig:** Im letzten Drittel der Schwangerschaft und in der Stillzeit darf neo-angin dolo orange grundsätzlich nicht eingenommen werden.

neo-angin dolo orange gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, welche die Fruchtbarkeit von Frauen beeinträchtigen können. Diese Wirkung ist nach Absetzen der Lutschtabletten umkehrbar. Es ist unwahrscheinlich, dass die gelegentliche Anwendung von neo-angin dolo orange die Möglichkeit, schwanger zu werden beeinflusst. Wenn Sie jedoch Probleme haben, schwanger zu werden, sprechen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

#### ***Wie verwenden Sie neo-angin dolo orange?***

##### *Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:*

Alle 3 bis 6 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen. Die Tagesdosis darf 5 Lutschtabletten nicht überschreiten.

Die Lutschtablette sollte während des Auflösendes im Mund bewegt werden. Wenn Reizungen im Mund auftreten, sollte die Behandlung mit neo-angin dolo orange abgebrochen werden. Wenden Sie neo-angin dolo orange nicht länger als 3 Tage und nur zur Behandlung der oben aufgeführten Beschwerden an. Wenden Sie möglichst wenige Lutschtabletten über einen möglichst kurzen Zeitraum an, wie es zur Linderung Ihrer Symptome erforderlich ist. Wenn sich die Beschwerden nicht spätestens innert 3 Tagen bessern, sollten Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin konsultieren, damit der Grund abgeklärt werden kann.

##### *Kinder unter 12 Jahren:*

neo-angin dolo orange darf bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

##### *Ältere Patienten:*



Ältere Patienten können empfindlicher auf das Arzneimittel reagieren als jüngere Erwachsene. Es ist besonders wichtig, dass ältere Patienten eventuelle Nebenwirkungen sofort Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin melden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

### **Welche Nebenwirkungen kann neo-angin dolo orange haben?**

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von neo-angin dolo orange auftreten, die unter Umständen einer ärztlichen Behandlung bedürfen.

*Sehr häufig (betrifft mehr als einen von 10 Anwendern)*

Unangenehmes Gefühl im Mund (Wärme, Brennen oder Kribbeln)

*Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Anwendern)*

Durchfall, Übelkeit, Geschwüre der Mundschleimhaut, Mundtrockenheit, Schmerzen im Mund, Reizung im Rachenraum, Schwindel, Kopfschmerzen,

*Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Anwendern)*

Schläfrigkeit, Blasenbildung im Mund und Rachenraum, vermindertes Empfinden im Rachen, Blähungen, Erbrechen, Verdauungsstörungen, Sodbrennen oder Schmerzen im Oberbauch, geblähter Magen, Verstopfung, veränderter Geschmacksinn, Hauterscheinungen wie Ausschlag und juckende Haut, Verschlimmerung von Asthma, Pfeifatmung, Kurzatmigkeit, Müdigkeit oder Schwierigkeiten beim Einschlafen, Fieber, Schmerzen.

*Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Anwendern)*

anaphylaktische Reaktionen.

#### *Einzelfälle*

Blutarmut, geringe Anzahl von Blutplättchen, Schwellungen, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, schwere Hautreaktionen wie Blasenbildung, Leberentzündung, Schmerzen im Brustkorb (Kounis-Syndrom).

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für die Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

### **Was ist ferner zu beachten?**

#### *Haltbarkeit*

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

#### *Lagerungshinweis*

neo-angin dolo orange in der Originalverpackung nicht über 30 °C lagern. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### *Weitere Hinweise:*

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

### **Was ist in neo-angin dolo orange enthalten?**

Eine Lutschtablette neo-angin dolo orange enthält:

#### *Wirkstoffe*

8.75 mg Flurbiprofen

#### *Hilfsstoffe*



Isomalt (E 953), Maltitol (E 965), Ponceau 4R (E 124), Gelborange S (E 110), Acesulfam-Kalium (E 950), Kaliumhydroxid, Aromastoffe (Orangenaroma enthält Citral, Citronellol und D-Limonen; Levomenthol).

### **Zulassungsnummer**

67961 (Swissmedic)

### **Wo erhalten Sie neo-angin dolo orange? Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

neo-angin dolo orange Lutschtabletten sind erhältlich in Packungen à 16 Lutschtabletten.

### **Zulassungsinhaberin**

Doetsch Grether AG, 4051 Basel

**Diese Packungsbeilage wurde im September 2024 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.**

