

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, de votre pharmacien ou votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

neo-angin® dolo orange, comprimés à sucer

Doetsch Grether AG

Qu'est-ce que neo-angin dolo orange et quand doit-il être utilisé?

Les comprimés à sucer de neo-angin dolo orange contiennent le principe actif flurbiprofène. neo-angin dolo orange convient au traitement à court terme, c'est-à-dire durant 3 jours au maximum, des pharyngites douloureuses.

L'effet est observé environ 30-40 minutes après l'application.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

neo-angin dolo orange comprimés à sucer contient 2.5 g d'hydrates de carbone assimilables par comprimé à sucer et est adapté aux personnes diabétiques.

Quand neo-angin dolo orange ne doit-il pas être pris?

- ⚠ Si vous êtes hypersensible à la substance active, le flurbiprofène, ou à d'autres anti-inflammatoires (antirhumatismaux), analgésiques ou antipyrétiques (p.ex. acide acétylsalicylique, aspirine). Ce type d'hypersensibilité s'exprime p.ex. par de l'asthme, une détresse respiratoire, des troubles circulatoires, un œdème de la peau et des muqueuses ou une éruption cutanée (urticaire).
- ⚠ Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez (voir également chapitre «neo-angin dolo orange peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?»).
- ⚠ Si vous souffrez d'ulcère gastrique ou duodéal, ou si vous présentez des hémorragies gastro-duodénales.
- ⚠ Chez les enfants de moins de 12 ans. neo-angin dolo orange n'a pas été étudié chez l'enfant de moins de 12 ans.
- ⚠ Si vous souffrez de troubles hémorragiques, de troubles de la formation des cellules sanguines ou de la coagulation.
- ⚠ Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque, ou d'insuffisance rénale ou hépatique sévère.
- ⚠ Si vous présentez une intolérance à certains types de sucres.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de neo-angin dolo orange?

Lors des situations suivantes, vous ne devez prendre neo-angin dolo orange que sur ordonnance et sous surveillance médicale:

- ⚠ si vous souffrez d'asthme;
- ⚠ si vous avez déjà souffert d'un ulcère gastrique ou duodéal;
- ⚠ si vous souffrez de problèmes rénaux ou de maladie du foie;
- ⚠ si vous êtes traité(e) pour une maladie cardiaque, en particulier une insuffisance cardiaque ou une hypertension;
- ⚠ si vous prenez un médicament anticoagulant (diluant le sang) ou si vous souffrez de troubles de coagulation;
- ⚠ si vous prenez un antirhumatismal ou un autre analgésique (p.ex. acide acétylsalicylique, aspirine);



⚠ si vous souffrez d'une maladie auto-immune chronique telle qu'un lupus érythémateux disséminé (LED) ou une collagénose mixte;

⚠ si vous êtes âgé(e), car vous êtes plus susceptible de développer les effets secondaires mentionnés dans cette notice d'emballage.

Lors de l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), dont fait également partie neo-angin dolo, des douleurs dans la poitrine, pouvant être le signe d'une réaction allergique potentiellement sévère appelée syndrome de Kounis, ont été rapportées.

Excipients

neo-angin dolo orange contient un arôme constitué d'allergènes (cital, citronellol et d-limonène). Les allergènes peuvent provoquer des réactions allergiques.

neo-angin dolo orange peut provoquer des réactions allergiques chez les patients qui sont hypersensibles aux colorants azoïques.

neo-angin dolo orange contient de l'isomalt et du maltitol. Si vous savez que vous présentez une intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre neo-angin dolo orange. La teneur calorique est de 2.3 kcal/g d'isomalt et de maltitol. neo-angin dolo orange peut avoir un effet laxatif léger.

Arrêtez d'utiliser les comprimés à sucer dès les premiers signes de réactions cutanées (éruption cutanée, desquamation de la peau, formation de cloques) ou d'autres signes d'une réaction allergique et consultez immédiatement un médecin. Informez votre médecin de tout symptôme inhabituel dans l'abdomen (surtout des saignements).

Si vos symptômes s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent (p.ex. de la fièvre, des troubles de la déglutition), veuillez consulter un médecin.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication)!

neo-angin dolo orange peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

neo-angin dolo orange ne doit pas être pris pendant la grossesse et l'allaitement sauf en cas de prescription médicale expresse. **Important:** de manière générale, neo-angin dolo orange ne doit pas être pris au cours du troisième trimestre de la grossesse et pendant l'allaitement.

neo-angin dolo orange fait partie d'un groupe de médicaments susceptibles d'altérer la fertilité chez les femmes. Cet effet est réversible à l'arrêt des comprimés à sucer. Il est peu probable qu'une utilisation occasionnelle de neo-angin dolo orange affecte vos possibilités de commencer une grossesse. Toutefois, si vous avez des difficultés à tomber enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

Comment utiliser neo-angin dolo orange?

Adultes et adolescents à partir de 12 ans:

Laissez fondre lentement dans votre bouche un comprimé à sucer toutes les 3 à 6 heures. Vous ne devez pas prendre plus de 5 comprimés à sucer par jour.

Vous devez faire bouger les comprimés à sucer dans votre bouche pendant qu'ils se dissolvent. Arrêtez le traitement par neo-angin dolo orange en cas d'apparition d'irritations dans la bouche.

N'utilisez pas neo-angin dolo orange pendant plus de 3 jours et ne l'utilisez que pour les symptômes décrits ci-dessus. Utilisez le moins de comprimés à sucer possible, pendant la durée la plus courte possible nécessaire au soulagement de vos symptômes. Si les symptômes ne se sont pas améliorés en l'espace de 3 jours, il vous est recommandé de consulter votre médecin afin d'en clarifier la cause.

Enfants de moins de 12 ans:

neo-angin dolo orange ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans.

Patients âgés:



Les patients âgés sont susceptibles de réagir de manière plus forte à ce médicament que des personnes plus jeunes. Il est particulièrement important que les patients âgés signalent immédiatement d'éventuels effets secondaires à leur médecin, à leur pharmacien ou à leur droguiste.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires neo-angin dolo orange peut-il provoquer?

Les effets indésirables suivants peuvent survenir lors de la prise de neo-angin dolo orange, nécessitant, le cas échéant, un traitement médical.

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

Sensation désagréable dans la bouche (sensation de chaleur, de brûlure ou de fourmillements).

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Diarrhée, nausées, ulcérations de la muqueuse buccale, sécheresse de la bouche, douleurs dans la bouche, irritation de la cavité pharyngée, vertiges, maux de tête.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Somnolence, formation de cloques dans la bouche ou la cavité pharyngée, diminution de la sensibilité dans la gorge, ballonnements, vomissements, troubles digestifs, brûlures d'estomac ou douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen, estomac gonflé, constipation, modification du goût, réactions cutanées telles qu'éruption et démangeaisons, aggravation d'un asthme, respiration sifflante, essoufflement, fatigue ou difficultés à s'endormir, fièvre, douleurs.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Réactions anaphylactiques.

Cas isolés

Anémie, diminution du nombre de plaquettes dans le sang, gonflements, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, réactions cutanées sévères telles que formation de cloques, hépatite, douleurs dans la poitrine (syndrome de Kounis).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver neo-angin dolo orange dans l'emballage d'origine à une température ne dépassant pas 30 °C. Conserver hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient neo-angin dolo orange?

Un comprimé à sucer de neo-angin dolo orange contient:

Principes actifs

8.75 mg de flurbiprofène



Excipients

Isomalt (E 953), maltitol (E 965), ponceau 4R (E 124), jaune orangé S (E 110), acésulfame potassique (E 950), hydroxyde de potassium, arômes (arôme d'orange contenant citral, citronellol et d-limonène; lévomenthol).

Numéro d'autorisation

67961 (Swissmedic)

Où obtenez-vous neo-angin dolo orange? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Les comprimés à sucer de neo-angin dolo orange sont disponibles en emballages de 16 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Doetsch Grether AG, 4051 Basel

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

