

## Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## Feraccru

### Che cos'è Feraccru e quando si usa?

Feraccru capsule rigide contiene ferro (sotto forma di maltolo ferrico). Feraccru è usato negli adulti per trattare la riduzione delle riserve di ferro nell'organismo. Bassi livelli di ferro causano un'anemia (quantità insufficiente di globuli rossi).

Su prescrizione medica.

### Quando non si può assumere/usare Feraccru?

- Se è allergico al maltolo ferrico o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicamento (vedere "Cosa contiene Feraccru?").
- Se ha una malattia che causa sovraccarico di ferro oppure un disturbo che influisce sull'utilizzo del ferro da parte dell'organismo (a meno che il medico non lo prescriva).

### Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Feraccru?

Prima di iniziare il trattamento, il suo medico si servirà di un esame del sangue per verificare che l'anemia non sia grave o causata da qualcosa di diverso dalla carenza di ferro (riserve di ferro ridotte).

Deve evitare di assumere Feraccru se si verifica una "riacutizzazione" della malattia infiammatoria cronica intestinale.

Informi il suo medico se ha ricevuto molte trasfusioni di sangue.

### Bambini e adolescenti

Feraccru non deve essere somministrato a bambini o adolescenti di età inferiore a 18 anni, poiché non è stato studiato in questa fascia di età. Una quantità eccessiva di ferro è pericolosa nei bambini piccoli e può avere conseguenze fatali.

### Assunzione di Feraccru con altri medicinali

Informi il medico se sta assumendo qualsiasi altro medicamento.

Deve lasciare trascorrere almeno 2 ore tra l'assunzione di Feraccru e l'assunzione di:

- Integratori alimentari o medicinali che contengono magnesio o calcio.
- Alcuni antibiotici, come ciprofloxacina e tetraciclina.
- Bifosfonati (usati per trattare l'osteoporosi).
- Penicillamina (usata per legare i metalli).
- Alcuni medicinali utilizzati per trattare la malattia di Parkinson (entacapone, levodopa) e le malattie della tiroide (levotiroxina).



- Micofenolato (usato con altri medicinali per impedire il rigetto degli organi trapiantati da parte dell'organismo).

Durante l'assunzione di Feraccru, non deve essere somministrato ferro mediante iniezione o infusione (per via endovenosa). Allo stesso modo, non si devono assumere altri preparati (inclusi integratori alimentari) contenenti ferro.

Non deve assumere Feraccru se sta assumendo dimercaprolo (un medicinale usato per rimuovere metalli tossici dal sangue), cloramfenicolo (usato per trattare le infezioni batteriche) o metildopa (usata per trattare la pressione sanguigna elevata).

*Lattosio:* se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Giallo tramonto FCF (E110) e rosso allura (E129) possono causare reazioni allergiche. I pazienti ipersensibili alle sostanze coloranti azoiche, all'acido acetilsalicilico, nonché agli antireumatici e analgesici (inibitori delle prostaglandine), devono astenersi dall'uso di Feraccru.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per capsula rigida, cioè è essenzialmente "senza sodio".

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applichi esternamente.

### **Si può assumere/usare Feraccru durante la gravidanza o l'allattamento?**

È preferibile non assumere Feraccru durante la gravidanza o l'allattamento con latte materno.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al suo medico o al suo farmacista prima di prendere questo medicinale.

### **Come usare Feraccru?**

#### Adulti (a partire dai 18 anni)

Prenda Feraccru a stomaco vuoto con mezzo bicchiere d'acqua (un'ora prima dei pasti oppure almeno 2 ore dopo i pasti). La dose raccomandata è una capsula rigida due volte al giorno (mattina e sera).

Ingerisca le capsule rigide intere.

#### Se prende più Feraccru di quanto deve

Se prende una quantità eccessiva di Feraccru può avvertire nausea, vomito, mal di pancia e diarrea. Contatti immediatamente il suo medico o l'ospedale se lei o un'altra persona ha preso troppo Feraccru. Si assicuri di portare con sé questo foglietto e tutte le capsule rigide rimanenti per mostrarli al medico.

#### Se dimentica di prendere Feraccru



Salti la dose dimenticata e prenda la dose successiva come al solito. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose precedente.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

### **Quali effetti collaterali può avere Feraccru?**

Gli effetti collaterali più comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10) di Feraccru sono:

- Dolore addominale
- Flatulenza (gas intestinale)
- Stitichezza
- Fastidio o gonfiore all'addome
- Diarrea
- Nausea
- Scolorimento delle feci

Gli effetti collaterali non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100) sono: sete, rigidità delle articolazioni, dolore alle dita delle mani/dei piedi, mal di testa, acne, rossore della pelle, vomito e aumento dei batteri nell'intestino tenue. Gli esami del sangue possono presentare un aumento dei livelli delle proteine che scompongono le sostanze chimiche nel sangue e di un ormone che stimola la tiroide. Feraccru può provocare reazioni di ipersensibilità della pelle e del sistema respiratorio, in particolare nei pazienti affetti da asma, orticaria (orticaria cronica) o ipersensibilità all'acido acetilsalicilico e ad altri antireumatici e analgesici.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

### **Di che altro occorre tener conto?**

#### *Stabilità*

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con "EXP" sul contenitore.

#### *Termine di consumo dopo l'apertura*

Non usare il medicamento per più di 45 giorni dopo la prima apertura del flacone.

#### *Istruzioni di conservazione*

Conservare a temperatura inferiore ai 25°C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### *Ulteriori indicazioni*

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene Feraccru?**

Una capsula rigida contiene:

#### *Principi attivi*

30 mg di ferro sotto forma di maltolo ferrico

#### *Sostanze ausiliarie*



Lattosio monoidrato, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, crospovidone, involucro della capsula rigida: ipromellosa, blu brillante FCF (E133), rosso allura AC (E129), diossido di titanio (E171), giallo tramonto FCF (E110), gommalacca, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico (E1520), idrossido di ammonio.

**Numero dell'omologazione**

66556 (Swissmedic)

**Dove è ottenibile Feraccru? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 56 capsule rigide.

**Titolare dell'omologazione**

Medius AG, 4132 Muttenz

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic):**

