

Informations destinées aux patients

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.

Vous avez soit obtenu ce médicament personnellement sur la base d'une ordonnance délivrée par votre médecin ou votre dentiste, soit vous l'avez acheté sans ordonnance médicale dans une pharmacie ou une droguerie. Utilisez ce médicament conformément à la notice ou selon les indications de votre médecin, dentiste, pharmacien/pharmacienne ou droguiste afin d'en tirer le plus grand bénéfice. Conservez la notice au cas où vous voudriez la consulter à nouveau plus tard.

Pour des raisons de meilleure lisibilité, les genres grammaticaux masculins et féminins ne sont plus utilisés simultanément. Toutes les références aux personnes concernent les deux genres.

Paro Gelée® aux fluorures d'amines

Qu'est-ce que Paro Amin-Fluor Gelée et quand doit-il être utilisé?

Paro Amin-Fluor Gelée est un concentré permettant l'enrichissement local en fluor de l'émail dentaire ainsi qu'une augmentation de la résistance aux caries.

Paro Amin-Fluor Gelée contient du fluorure d'amines et de sodium inhibant la formation de caries. Il est utilisé en application locale sur l'émail dentaire et sa teneur en fluor est plus concentrée que celle du dentifrice. Il n'est donc pas appliqué quotidiennement, une fois par semaine suffit. Cet enrichissement périodique en fluor est maintenu ou renforcé par un brossage quotidien avec un dentifrice au fluor.

Quand Paro Amin-Fluor Gelée ne doit-il pas être pris?

Paro Amin-Fluor Gelée ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 6 ans, car leur réflexe de déglutition n'est pas encore bien développé. Paro Amin-Fluor Gelée ne doit pas être utilisé par les personnes présentant une hypersensibilité à ce produit ou à l'un de ses ingrédients.

Quand faut-il être prudent lors de l'utilisation de Paro Amin-Fluor Gelée?

En présence d'une fluorose osseuse et/ou de l'émail, il convient de s'abstenir d'utiliser Paro Amin-Fluor. Il faut utiliser ce produit avec précaution si le réflexe de déglutition ne peut être contrôlé.

Les personnes hypersensibles aux colorants azoïques, à l'acide acétylsalicylique ainsi qu'aux antirhumatismaux et aux analgésiques (inhibiteurs des prostaglandines) ne doivent pas utiliser Paro Amin-Fluor Gelée.

Informez votre médecin, dentiste, pharmacien ou droguiste si vous souffrez d'autres maladies, si vous avez des allergies ou si vous prenez ou appliquez d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

Peut-on utiliser Paro Amin-Fluor pendant la grossesse ou l'allaitement?

Les expériences faites à ce jour n'ont révélé aucun risque pour l'enfant lorsque le produit est utilisé conformément aux indications. Cependant, il n'y a jamais eu d'études scientifiques systématiques. Par mesure de précaution, vous devriez éviter de prendre des médicaments dans la mesure du possible pendant la grossesse et l'allaitement ou demander conseil à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser Paro Amin-Fluor Gelée?



Adultes et enfants dès 6 ans : sauf prescription contraire, une fois par semaine, le soir, après le brossage des dents. Appliquez une quantité de Paro Amin-Fluor Gelée de la taille d'un petit pois sur la brosse à dents et brossez-vous les dents pendant 1 à 2 minutes. Recrachez l'excédent, mais ne vous rincez pas la bouche. Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés pendant l'utilisation du produit.

À l'école :

À l'école, Paro Amin-Fluor Gelée se prête à l'apprentissage du brossage des dents en classe dans le cadre de la prophylaxie des caries dentaires en milieu scolaire. La fréquence d'utilisation dépend des possibilités organisationnelles de la municipalité ou de l'école. L'application du produit se fait comme décrit ci-dessus.

Au cabinet dentaire et médical :

Paro Amin-Fluor Gelée peut être appliqué comme un fluorure topique à l'aide d'un bâtonnet ouaté ou d'une brosse. L'application à l'aide d'une gouttière Miniplast ou d'une cuillère à cire de forme appropriée est particulièrement efficace et durable. En cas de forte activité carieuse, il est conseillé de laisser de petits résidus de gelée dans les fissures et les espaces interdentaires chez les enfants à partir de 8 ans lorsqu'ils quittent le cabinet. Respectez le dosage indiqué sur la notice ou prescrit par votre médecin ou votre dentiste. Si vous pensez que l'action du médicament est trop faible ou trop forte, parlez-en à votre médecin, dentiste, pharmacien ou droguiste.

Quels effets secondaires Paro Amin-Fluor Gelée peut-il provoquer?

L'utilisation de Paro Amin-Fluor Gelée peut provoquer les effets indésirables suivants : peut déclencher des réactions d'hypersensibilité au niveau de la muqueuse et des organes respiratoires, en particulier chez les patients souffrant d'asthme, d'urticaire (chronique), ou hypersensibles à l'acide acétylsalicylique ou à d'autres antirhumatismaux et analgésiques.

Si vous remarquez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, dentiste, pharmacien ou droguiste. Il en va de même pour les effets indésirables qui ne sont pas mentionnés dans cette notice.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date indiquée sur l'emballage après la mention « EXP ».

Conseil de stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver le tube dans le carton extérieur pour protéger le contenu de l'humidité.

Tenir hors de la portée des enfants.

Votre médecin, dentiste, pharmacien ou droguiste vous donnera de plus amples informations.

Que contient Paro Amin-Fluor Gelée?

Paro Amin-Fluor Gelée est un gel dentaire utilisé en application locale sur l'émail dentaire.

Principes actifs

Fluorure de sodium 25,4 mg (correspond. 1,15% de fluorure), Olaflur/Dectaflur 13,3 mg (corresp. 0.10% de fluorure)

Adjuvants



Arômes, vanilline, saccharine, colorant : coccine nouvelle (E 124) ainsi que d'autres excipients (goût de fraise).

Numéro d'autorisation

51'226 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Paro Amin-Fluor Gelée? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Dans les pharmacies et les drogueries, sans ordonnance.

Emballage grand public : tube de 25 g, environ 40 applications

Emballage pour hôpitaux : paquet de 200 ml

Titulaire de l'autorisation

ESRO AG, 8802 Kilchberg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

