

Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo, poiché contiene informazioni importanti. Questo farmaco è stato consegnato personalmente dal proprio medico o dentista su prescrizione oppure è stato acquistato in farmacia senza prescrizione medica. Utilizzare il farmaco secondo il foglietto illustrativo e sulla base delle istruzioni del medico, dentista o farmacista per ottenere i massimi vantaggi. Conservare il foglietto illustrativo per poterlo consultare in un momento successivo. Per una migliore leggibilità il testo non presenta distinzioni tra forma maschile e femminile. Tutti i riferimenti personali valgono per entrambi i sessi.

Gel Paro al fluoruro amminico

Che cos'è Paro Amin-Fluor Gelée quando si usa?

Paro Amin-Fluor Gelée è un concentrato per la fluorizzazione locale dello smalto dentale e l'aumento della resistenza alle carie.

Paro Amin-Fluor Gelée contiene fluoruro amminico e di sodio per la prevenzione delle carie, si somministra esternamente sulla superficie dentale e presenta un contenuto di fluoruro superiore ad un dentifricio. Il suo utilizzo pertanto non è giornaliero, bensì a intervalli settimanali. Questo effetto di fluorizzazione periodica viene mantenuto o intensificato mediante lo spazzolamento giornaliero dei denti con dentifricio al fluoro.

Quando non si può assumere Paro Amin-Fluor Gelée?

I bambini con meno di 6 anni non possono utilizzare Paro Amin-Fluor Gelée, poiché il riflesso di ingerimento è meno sviluppato. Paro Amin-Fluor Gelée non può essere utilizzato in caso di sovrasensibilità al prodotto o a uno degli eccipienti.

Quando si consiglia cautela nell'uso di Paro Amin-Fluor Gelée?

In caso di fluorosi delle ossa e/o dello smalto si deve evitare l'uso di Paro Amin-Fluor Gelée.

Utilizzare con cautela solo se non si riesce a controllare il riflesso di ingerimento.

Gli utenti con una sovrasensibilità ai coloranti azoici, agli acidi acetilsalicilici, nonché agli antidolorifici per reumatismi e analgesici (prostaglandine) non possono assumere Paro Amin-Fluor Gelée.

Rivolgersi al proprio medico, dentista o farmacista, se

si soffre di altre patologie, si hanno allergie o si assumono altri farmaci (anche acquistati autonomamente!) oppure si utilizzano prodotti esternamente.

Paro Amin-Fluor Gelée può essere utilizzato in gravidanza o durante l'allattamento?

Sulla base delle esperienze precedenti non è noto alcun rischio per il bambino in caso di utilizzo conforme. Non sono mai stati eseguiti studi scientifici sistemici. In forma cautelare, durante la gravidanza e l'allattamento, si dovrebbe evitare di assumere farmaci il più possibile oppure chiedere un consulto al medico o farmacista.

Come usare Paro Amin-Fluor Gelée?

Adulti e bambini da 6 anni: Salvo diversamente prescritto 1 volta a settimana di sera, dopo aver lavato i denti. Applicare una quantità di una lenticchia di Paro Fluor-Gelée sullo spazzolino e spazzolare i denti per 1-2 minuti. Sputare la quantità in eccesso, ma non sciacquare. Sorvegliare l'uso nei bambini con meno di 8 anni.



A scuola:

A scuola Paro Amin-Fluor Gelée è indicato come prodotto di fluorizzazione per gli esercizi di spazzolamento insegnati in classe nell'ambito della profilassi scolastica sulle carie. La frequenza di applicazione si basa sulle possibilità organizzative della scuola. Il tipo di applicazione segue la descrizione.

Nello studio dentistico e medico:

Paro Amin-Fluor Gelée può essere applicato come pasta mediante cotone idrofilo o una spazzola. Particolare efficace e durevole si è rivelato l'uso con l'ausilio di un paradenti individuale o di un cucchiaino di cera adeguatamente formato. In caso di elevata attività di carie nei bambini a partire da 8 anni di età, si consiglia di rimuovere i piccoli residui di gel dalle fissurazioni e dagli spazi interdentali. Attenersi al dosaggio indicato nel foglietto illustrativo o prescritto dal medico o dal farmacista. Se si ritiene che il farmaco abbia un effetto troppo debole o forte, consultare un medico, dentista o farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Paro Amin-Fluor Gelée?

L'uso di Paro Amin-Fluor Gelée può avere i seguenti effetti collaterali:

Può scatenare reazioni di sovrasensibilità della mucosa e degli organi respiratori, in particolare in pazienti con asma, febbre delle ortiche (orticaria cronica) oppure con sovrasensibilità all'acido acetilsalicilico e altri antidolorifici per i reumatismi e analgesici.

Se si riscontrano effetti collaterali, rivolgersi al proprio medico, dentista o farmacista. Questo vale in particolare per effetti collaterali che non sono riportati nel presente foglio illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il farmaco può essere utilizzato solo entro la data sulla confezione, contrassegnata con "EXP".

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare la confezione nel cartone per proteggere il contenuto dall'umidità.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Richiedere ulteriori informazioni presso il proprio medico, dentista o farmacista.

Cosa contiene Paro Amin-Fluor Gelée?

Paro Amin-Fluor Gelée è un gel dentale per l'uso sulla superficie dentale.

Fluoruro di sodio 25,4 mg (1,15% di fluoruro), Olaflur/Dectaflur 13,3 mg (0,10% di fluoruro)

Aromi, vaniglia, saccarina, coloranti: rosso cocciniglia (E 124) e altri eccipienti. (sapore di fragola)

Numero dell'omologazione

51'226 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Paro Amin-Fluor Gelée? Quali confezioni sono disponibili?

Nelle farmacie e parafarmacie, senza prescrizione medica.

Confezione al pubblico: tubetto da 25 g, circa 40 applicazioni

Confezione per gli ambulatori: Contenitore da 200 ml

Titolare dell'omologazione

ESRO AG, 8802 Kilchberg



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

