

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

LIOTON® 1000 Gel

A. Menarini GmbH

Che cos'è Lioton 1000 Gel e quando si usa?

Lioton 1000 Gel è un preparato a base di eparina ad uso esterno sotto forma di gel che si usa in caso di:

- problemi legati a vene varicose, come dolori, sensazione di pesantezza, gonfiore alle gambe (edema congestionante);
- traumi contusivi nel corso della pratica sportiva o dopo incidenti quali contusioni, schiacciamenti, stiramenti con ematomi e gonfiori;
- dolori muscolari e tendini;

Su prescrizione medica, Lioton 1000 Gel può anche essere usato in caso di infiammazioni delle vene (superficiali), per la terapia successiva a una sclerotizzazione nonché per coadiuvare la terapia in caso di trombosi venosa.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Segua i consigli del suo medico oltre alle istruzioni di posologia, per esempio fare ginnastica o portare le calze elastiche.

Quando non si può usare Lioton 1000 Gel?

In caso di ipersensibilità nota al principio attivo o ad uno dei costituenti. Lioton 1000 Gel non dev'essere usato in caso di conosciuta trombopenia indotta da eparina (HIT, mancanza di piastrine dovuta all'eparina).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lioton 1000 Gel?

Dopo l'applicazione o il massaggio di Lioton 1000 Gel, lavarsi le mani per evitare un contatto accidentale con le mucose o la congiuntiva degli occhi. Impiegare solo sulla cute intatta e mai su ferite aperte.

In caso di disturbi venosi causati da un coagulo di sangue (cosiddetta trombosi) non massaggiare il gel. Se i sintomi persistono a lungo o si aggravano bisogna consultare un medico.

Se appaiono reazioni d'ipersensibilità interrompere il trattamento e consultare il medico.

Questo medicamento contiene 243 mg di alcol (etanolo 96%) in ogni grammo di gel. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata. Questo medicamento contiene un aroma con limonene e linalolo. Il limonene e il linalolo possono causare reazioni allergiche.

Il metil paraidrossi benzoato e il propil paraidrossi benzoato possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie
- o assume o applica esternamente altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Lioton 1000 Gel durante la gravidanza o l'allattamento?



Informi il suo medico se è incinta o se allatta. Per quanto riguarda Lioton 1000 non esistono dati sul rischio possibile del nascituro o del bambino nel periodo di allattamento. Il medico deciderà se Lioton 1000 Gel è adatto al vostro caso.

Come usare Lioton 1000 Gel?

Adulti

Applicare 1-3 volte al giorno 3-10 cm di gel sulle superfici cutanee affette e massaggiare delicatamente. Massaggiare le gambe dal basso verso l'alto. In caso d'infiammazioni delle vene, non massaggiare ma applicare con uno strato di 1-2 mm e coprire con una fasciatura. Impiegare solo sulla cute intatta e non sulle mucose.

Bambini ed adolescenti

L'uso e la sicurezza di Lioton 1000 Gel non sono stati studiati finora nei bambini e adolescenti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Lioton 1000 Gel?

In seguito all'uso di Lioton 1000 Gel possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Reazioni allergiche localizzate.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15–25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Lioton 1000 Gel?

1 g di gel contiene:

Principi attivi

Eparina sodica 1000 U.I.

Sostanze ausiliarie

Etanolo 96%, carbomer 940, trolamina, propil paraidrossi benzoato (E 216), metil paraidrossi benzoato (E 218), lavanda essenza, linalolo, d-limonene, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

50476 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Lioton 1000 Gel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubi da 50 g e 100 g.



Titolare dell'omologazione

A. Menarini GmbH, Zurigo.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

