

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Mebucaïne Plus Cherry, Mebucaïne Plus Lemon, comprimés à sucer

Spirig HealthCare AG

Qu'est-ce que Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon et quand doit-il être utilisé?

Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon est un médicament destiné au traitement local des inflammations de la bouche et de la gorge, telles que mal de gorge, déglutition difficile, inflammation des gencives, aphtes, etc. La tyrothricine et le bromure de cétrimonium exercent une action antibactérienne et désinfectante. La lidocaïne atténue les douleurs liées à l'inflammation des muqueuses de la cavité buccale et de la gorge.

Quand Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon ne doit-il pas être utilisé?

Ne pas utiliser Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon en cas d'hypersensibilité (allergie) à la tyrothricine, au bromure de cétrimonium, à la lidocaïne, aux autres anesthésiques locaux de type amide ou à un autre composant de Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon.

Les patients présentant une intolérance héréditaire au fructose (IHF) ne doivent pas utiliser ce médicament (voir «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon?»).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon?

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien dans les cas suivants:

- si vous souffrez de maux de gorge et de fièvre depuis plusieurs jours.
- en cas de lésions de la muqueuse de la bouche et de la gorge.
- si les symptômes ne s'améliorent pas ou durent plus de 5–7 jours.
- si les maux de gorge sont accompagnés d'une forte fièvre (angine), de vertiges, de vomissements ou de graves troubles de la déglutition.

Ne vous brossez pas les dents juste avant ou après l'utilisation de Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon; le dentifrice pourrait diminuer l'effet de Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon.

Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon ne doit pas être utilisé pendant ou juste avant de boire ou de manger. L'effet anesthésiant local de la lidocaïne peut provoquer un engourdissement passager de la langue et la gorge et donc affecter la déglutition. Ne buvez ou ne mangez rien tant que cet engourdissement persiste.

Dans les cas suivants, vous devez cesser d'utiliser Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon et informez votre médecin immédiatement:

- en cas de diarrhée accompagnée de sang et de mucus, de douleurs d'estomac ou de crampes et/ou de fièvre,
- en cas d'une nouvelle infection,
- si les symptômes s'aggravent.

Information sur les excipients



Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon contient environ 1 g de sorbitol (E 420) par comprimé à sucer. Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé que vous présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous ne preniez ce médicament.

Le sorbitol peut causer une gêne gastro-intestinale et un effet laxatif léger.

Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé à sucer, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Mebucaïne Plus Cherry contient un arôme composé de cinnamal, de citral, d'eugénol et de géraniol, qui peuvent provoquer des réactions allergiques.

Mebucaïne Plus Lemon contient du butylhydroxyanisole (E 320), qui peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Mebucaïne Plus Lemon contient un arôme composé de citral, qui peut provoquer des réactions allergiques.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication)!

Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou allaitez, si vous pensez être enceinte ou prévoyez une grossesse, vous devriez renoncer par mesure de précaution à prendre des médicaments ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste avant de prendre des médicaments.

Comment utiliser Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon?

La dose efficace la plus faible devrait toujours être utilisée pendant la plus courte durée possible. Ne pas dépasser la posologie recommandée.

Les comprimés à sucer ne doivent être ni mâchés, ni avalés entiers.

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes

1 comprimé à sucer toutes les 1 à 3 heures. Une dose quotidienne totale de 8 comprimés à sucer ne doit pas être dépassée.

Mode d'emploi:

Pour une utilisation dans la cavité buccale.

Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon contre le mal de gorge se déplacent lentement dans la bouche pendant la succion, ne le laissez pas fondre dans la poche de la joue.

En cas de mal de gorge grave ou de mal de gorge accompagné d'une forte fièvre, de maux de tête, de nausées ou de vomissements, ne pas utiliser pendant plus de 2 jours sans avis médical.

En cas d'aphtes, laisser fondre lentement les comprimés à sucer directement sur l'endroit concerné.

Enfants et adolescents

L'utilisation et la sécurité de Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.



Si vous avez utilisé une plus grande quantité de Mebucaïne Plus Cherry ou de Mebucaïne Plus Lemon que vous ne deviez, consultez immédiatement votre médecin.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon peut-il provoquer?

L'utilisation de Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon peut provoquer les effets secondaires suivants:

Arrêtez le traitement par Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon et informez immédiatement votre médecin si l'un ou plusieurs des symptômes suivants apparaissent, ceux-ci pouvant indiquer une réaction allergique:

- troubles respiratoires ou de la déglutition,
- gonflements du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge,
- fortes démangeaisons de la peau avec éruption rouge ou vésicules.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Des irritations locales se produisent dans la bouche ou la gorge, surtout lors d'une prise fréquente et prolongée. L'application de tyrothricine sur des plaies récentes peut provoquer des saignements.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Des nausées peuvent survenir, surtout lorsque les comprimés à sucer sont pris à jeun et à fortes doses (à cause de la lidocaïne contenue dans les comprimés à sucer).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25 °C) et à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon?

Principes actifs

1 comprimé à sucer contient: tyrothricine 4 mg, bromure de cétrimonium 2 mg, lidocaïne 1 mg.

Excipients

Mebucaïne Plus Cherry: sorbitol (E 420), galactomannane guar, acide citrique, talc, povidone K25, saccharine sodique, stéarate de magnésium, oxyde de fer rouge (E 172), arôme de cerise (contient du cinnamal, du citral, de l'eugénol et du géraniol).

Mebucaïne Plus Cherry sont des comprimés à sucer rose à rouge, mouchetés de blanc, rectangulaires aux bords limés des deux côtés, au goût de cerise.



Mebucaïne Plus Lemon: sorbitol (E 420), acide citrique, talc, arôme de citron (contient du butylhydroxyanisole [E 320], du citral et du sorbitol [E 420]), galactomannane guar, stéarate de magnésium, silice colloïdale, saccharine sodique, arôme de menthe, jaune de quinoléine (E 104), indigotine (E 132), hydroxyde d'aluminium.

Mebucaïne Plus Lemon sont des comprimés à sucer légèrement jaunâtres à verdâtres, mouchetés, rectangulaires aux bords limés des deux côtés, au goût de citron.

Numéro d'autorisation

62301, 62302 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Mebucaïne Plus Cherry ou Mebucaïne Plus Lemon? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Boîtes de 24 comprimés à sucer en deux arômes: cerise et citron.

Titulaire de l'autorisation

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

