

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin, Gocce orali

Medicinale omeopatico

Quando si usa Dr. Reckeweg R74 Nocturnin?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Dr. Reckeweg R74 Nocturnin può essere usato in caso di insufficienza urinaria con perdita involontaria di urina durante la notte.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Dr. Reckeweg R74 Nocturnin.

Quando non si può assumere Dr. Reckeweg R74 Nocturnin e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 5 anni.

L'incontinenza urinaria può avere cause diverse. Ad esempio, raffreddamenti, disturbi nervosi o conflitti emotivi. In caso di recidive o persistenza dei sintomi o di febbre, consultare un medico.

Questo medicamento contiene 168 mg di alcol (etanolo) in ogni dose di 15 gocce (0.6 ml) che è equivalente a 280 mg/ml (35%V/V). La quantità in 15 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 5 ml di birra o 2 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

Informi il suo medico, farmacista o droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere Dr. Reckeweg R74 Nocturnin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente.

Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Dr. Reckeweg R74 Nocturnin?

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 5 anni.

Salvo diversa prescrizione medica:

Bambini dai 5 anni in su: da 8 a 10 gocce 3 volte al giorno in poca acqua. La frequenza può essere ridotta a 2 volte al giorno dopo 2 o 3 settimane.

Adolescenti dai 12 ai 18 anni: da 10 a 15 gocce 3 volte al giorno in poca acqua. La frequenza può essere ridotta a 2 volte al giorno dopo 2 o 3 settimane.

Adulti: 10-15 gocce 3 volte al giorno non diluite o diluite in poca acqua per un periodo abbastanza lungo.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico.

Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Dr. Reckeweg R74 Nocturnin?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Dr. R74 Nocturnin. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Dr. Reckeweg R74 Nocturnin e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?



Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con <Exp> sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene Dr. Reckeweg R74 Nocturnin?

1 ml di liquido contiene:

Causticum Hahnemanni (HAB) D30 0.1 ml

Ferrum phosphoricum (HAB) D8 0.2 ml

Kalium phosphoricum (HAB) D12 (HAB 5a) 0.2 ml

Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (HAB) D12 0.2 ml

Sepia officinalis (Sepia) (HAB) D6 0.2 ml

Sostanze ausiliarie: Etanolo, acqua purificata. Contiene 35 % vol. di alcol.

1 ml corrisponde a 25 gocce.

Numero dell'omologazione

45101 (Swissmedic)

Dove sono ottenibile Dr. Reckeweg R74 Nocturnin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia o in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4, 1680 Romont, Svizzera

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

64625 Bensheim, Germania

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

