

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

apo-Dolor® N, gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand apo-Dolor® N, gouttes est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, apo-Dolor® N, gouttes peut être utilisé en cas de maux de tête.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si apo-Dolor® N, gouttes peut être pris simultanément.

Quand apo-Dolor® N, gouttes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

apo-Dolor® N, gouttes ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans (teneur en alcool). Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

apo-Dolor® N, gouttes contient 44 vol-% d'alcool.

apo-Dolor® N, gouttes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser apo-Dolor® N, gouttes?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes 20 gouttes 3 – 4 fois par jour, enfants dès 12 ans 10 – 15 gouttes 3 – 4 fois par jour dans du liquide avant les repas.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires apo-Dolor® N, gouttes peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de apo-Dolor® N, gouttes n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en



informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec apo-Dolor® N, gouttes et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Verw.b.» sur le récipient. apo-Dolor® N, gouttes contient 44 % vol d'alcool. Conserver les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient apo-Dolor® N, gouttes?

1 g de solution contient:

Arnica montana spag. PEKA D4 120 mg ; Gelsemium D4 120 mg ; Iris versicolor D3 120 mg ; Menyanthes D3 120 mg ; Piper methysticum (Kava-Kava) spag. PEKA D8 140 mg ; Spigelia anthelmia D3 120 mg ; Tabacum D6 120 mg ; Usnea barbata D2 140 mg.

Cette préparation contient en outre 44 % vol d'alcool comme excipient.

Numéro d'autorisation

51979 (Swissmedic)

Où obtenez-vous apo-Dolor® N, gouttes ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 50 ml et 100 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2006 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

