

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

apo-Dolor® N, gocce

Medicamento omeopatico-spagirico

Quando si usa apo-Dolor® N, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, apo-Dolor® N, gocce può essere usato in caso di mal di testa.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può assumere apo-Dolor® N, gocce.

Quando non si può usare apo-Dolor® N, gocce e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non si può usare apo-Dolor® N, gocce per le bambini di età inferiore ai 12 anni (contenuto d'alcool). Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se soffre di altre malattie, soffre di allergie o, assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa). apo-Dolor® N, gocce contiene 44 % vol. di alcool.

Si può assumere apo-Dolor® N, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, suo farmacista o il suo droghiere.

Come usare apo-Dolor® N, gocce?

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti 3 – 4 volte al giorno 20 gocce, adolescenti di età superiore ai 12 anni 3 – 4 volte al giorno 10 – 15 gocce, in un po' di liquido prima dei pasti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere apo-Dolor® N, gocce?



Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di apo-Dolor® N, gocce. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con apo-Dolor® N, gocce e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "Verw.b." sulla confezione. apo-Dolor® N, gocce contiene 44 % vol. di alcool. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene apo-Dolor® N, gocce?

1 g di soluzione contiene:

Arnica montana spag. PEKA D4 120 mg; Gelsemium D4 120 mg; Iris versicolor D3 120 mg; Menyanthes D3 120 mg; Piper methysticum (Kava-Kava) spag. PEKA D8 140 mg; Spigelia anthelmia D3 120 mg; Tabacum D6 120 mg; Usnea barbata D2 140 mg

Questo preparato contiene 44 % vol. di alcool come sostanza ausiliaria.

Numero dell'omologazione

51979 (Swissmedic)

Dove è ottenibile apo-Dolor® N, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 ml e 100 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

