

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Motilium lingual Gastrosan®

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH

Che cos'è Motilium lingual Gastrosan e quando si usa?

Motilium lingual Gastrosan serve per il trattamento sintomatico di nausea e vomito.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In concomitanza con l'assunzione di Motilium lingual Gastrosan possono presentarsi alcuni rari effetti collaterali, che rendono necessario interrompere immediatamente il trattamento e rivolgersi subito a un medico. Le indicazioni dettagliate sono contenute in "Quali effetti collaterali può avere Motilium lingual Gastrosan?"

Quando non si può assumere/usare Motilium lingual Gastrosan?

Non si può usare Motilium lingual Gastrosan in caso di:

- se è allergico (ipersensibile) al principio attivo o ad uno dei costituenti della formulazione (un'ipersensibilità si presenta ad es. sotto forma di eruzione cutanea, prurito, dispnea o gonfiori al viso).
- malattia dell'ipofisi, detta prolattinoma.
- malattie gastrointestinali gravi (emorragie, occlusione intestinale meccanica o perforazione dell'intestino). Affezioni di questo genere possono manifestarsi con forti crampi addominali od emissione di feci sempre scure.
- malattia epatica in corso o contratta in passato.
- se il suo ECG (elettrocardiogramma) indica un problema cardiaco, denominato, «intervallo QT lungo».
- se ha o ha avuto un problema per cui il cuore, non è in grado di pompare sangue al corpo come dovrebbe (insufficienza cardiaca).
- se ha un problema per cui i livelli di potassio o di magnesio nel sangue sono diminuiti o il livello di potassio è aumentato.
- se si assumono contemporaneamente i seguenti medicinali che inibiscono l'enzima epatico CYP3A4, che rallentano nel corpo il metabolismo di altri farmaci o che possono compromettere il ritmo cardiaco:
 - certi medicinali (cosiddetti antimicotici azolici) per il trattamento di infezioni fungine, quali il chetoconazolo, l'itraconazolo, il posaconazolo, o il voriconazolo;
 - certi antibiotici come l'eritromicina, la claritromicina o la telitromicina, che si usano contro le infezioni batteriche;
 - determinati medicinali contro le infezioni da virus HIV (inibitori delle proteinasi dell'HIV) come ritonavir o saquinavir.
- se ha o può avere un tumore raro della ghiandola surrenale (feocromocitoma), perché può aumentare la pressione sanguigna.



Si sconsiglia di somministrare Motilium lingual Gastrosan compresse orodispersibili ai bambini al di sotto dei 12 anni, adulti e adolescenti con peso corporeo inferiore ai 35 kg.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Motilium lingual Gastrosan?

Se ha oltre 60 anni, prima di prendere Motilium chiedi consiglio al tuo medico.

Se parallelamente si assumono altri medicinali (compresi preparati a base di piante medicinali), è assolutamente necessario segnalarli al medico curante o al farmacista, dato che l'assunzione concomitante di Motilium lingual Gastrosan e medicinali che influenzano l'azione di una determinata proteina, l'enzima epatico CYP3A4, può portare ad interazioni farmacologiche.

Informare il medico curante o il farmacista se in passato si sono manifestati problemi di cuore o se attualmente si soffre di cardiopatie, quali insufficienza cardiaca, infarto del miocardio, angina pectoris o aritmie cardiache (frequenza cardiaca accelerata, rallentata o irregolare).

Se si nota un ritmo cardiaco anormale durante il trattamento, smetta di prendere Motilium lingual Gastrosan e consulti immediatamente il suo medico.

I pazienti ad alto rischio di sviluppare determinate aritmie cardiache (sindrome del QT lungo) dovrebbero parlarne col medico curante, prima di assumere Motilium lingual Gastrosan.

Si sconsiglia di somministrare Motilium lingual Gastrosan compresse orodispersibili a pazienti con malattie epatiche.

Nei pazienti affetti da nefropatia, il medico considererà la necessità di un aggiustamento del dosaggio, specie se devono assumere Motilium lingual Gastrosan per lungo tempo.

Informi il suo medico se sta assumendo medicinali che riducono l'acidità gastrica.

Si sconsiglia di assumere Motilium lingual Gastrosan compresse orodispersibili contemporaneamente a medicinali che riducano l'acido gastrico. Si deve prendere Motilium lingual Gastrosan compresse orodispersibili *prima* dei pasti e il medicamento contro l'acidità dopo i pasti.

Informi il suo medico se sta assumendo anticolinergici (medicamenti usati per trattare allergie, asma, incontinenza urinaria, crampi gastrointestinali, spasmi muscolari, disturbi di depressione o di sonno, come ad esempio destrometorfano o difenidramina). Di fatto, questi medicinali possono influenzare l'azione di Motilium lingual Gastrosan.

Non guidare veicoli né utilizzare macchinari se si sente stanco, avverte sonnolenza o vertigini dopo aver preso il farmaco.

Informi il medico o il farmacista se

- assume farmaci per il trattamento di infezioni fungine o batteriche, problemi cardiaci, malaria, AIDS/HIV, depressione, malattie mentali, problemi gastrointestinali, cancro, dolore o dipendenza.
- assume aprepitant, un farmaco per sedare la nausea causata da chemioterapia.

Il suo medico deciderà se questi medicinali possono essere assunti con Motilium lingual Gastrosan o se esiste la necessità di un attento monitoraggio per l'insorgenza di problemi cardiaci.

Motilium lingual Gastrosan, compresse orodispersibili

- Contengono 0,75 mg Aspartame per compressa orodispersibile. Aspartame è una fonte di fenilalanina. Può essere dannosa se è affetto da fenilchetonuria, una rara malattia genetica che causa l'accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente.
- Contengono 0,0038 mg di alcol benzilico per compressa orodispersibile. Alcol benzilico può causare reazioni allergiche.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere/usare Motilium lingual Gastrosan durante la gravidanza o l'allattamento?



Gravidanza

Non è noto se l'uso di Motilium lingual Gastrosan durante la gravidanza sia dannoso. Se è incinta o pensa di poterlo essere, si rivolga al medico che deciderà se può prendere Motilium lingual Gastrosan.

Allattamento

Piccole quantità di Motilium lingual Gastrosan sono stati rilevate nel latte materno. L'uso durante l'allattamento non è raccomandato

Come usare Motilium lingual Gastrosan?

Motilium lingual Gastrosan funziona meglio quando assunto 15 - 30 minuti prima dei pasti e prima di coricarsi.

Le dosi sottoelencate sono indicative e possono essere adattate dal medico a seconda delle necessità individuali.

Adolescenti di sopra dei 12 anni ed adulti fino a 60 anni con un peso corporeo pari o superiore a 35 kg

1 compressa orodispersibile da 10 mg fino a 3 volte al giorno, prima del pasto. La dose massima è di 3 compresse da 10 mg al giorno.

Motilium lingual Gastrosan non deve essere assunto per più di una settimana. Rivolgersi al medico se nausea e vomito persistono per più di una settimana.

Bambini al di sotto dei 12 anni, adulti e adolescenti con un peso corporeo inferiore a 35 kg

Motilium lingual Gastrosan, compresse orodispersibili non sono adatti per i bambini al di sotto dei 12 anni, adulti e adolescenti con un peso corporeo inferiore a 35 kg.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Motilium lingual Gastrosan?

Interrompa immediatamente il trattamento con Motilium lingual Gastrosan e si rivolga subito al medico, se si manifesta uno degli effetti collaterali riportati qui di seguito.

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10 000)

- crampi
- vertigine
- movimenti involontari del viso o delle braccia e gambe, forte tremore, strema rigidità muscolare o spasmi muscolari
- reazione allergica, che può comparire appena dopo la somministrazione e che si manifesta sotto forma di eruzione cutanea, prurito, respiro breve e/o viso tumefatto
- forte reazione da ipersensibilità che può presentarsi appena dopo la somministrazione e che può manifestarsi, oltre che con altri sintomi, sotto forma di orticaria, prurito, arrossamenti, perdita di conoscenza e tumefazioni delle mani, dei piedi, del viso o nella zona della laringe possono manifestarsi, che può portare a problemi di deglutizione e di respirazione.
- aritmia cardiaca

In casi singoli è stata descritta morte improvvisa causata da improvvisa perdita della funzione cardiaca, in particolare in persone con probabili patologie cardiache pregresse.

Con l'assunzione di Motilium lingual Gastrosan sono stati riscontrati altri effetti collaterali che vengono elencati qui sotto:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

- bocca secca



Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

- stati di angoscia
- perdita d'interesse o diminuzione dell'interesse al sesso
- cefalea
- sonnolenza
- diarrea
- eruzione
- prurito
- dolori al petto o sensibilità alla pressione sul petto
- secrezione lattea dal petto
- senso di debolezza generale

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10 000):

- Mammelle gonfie
- interruzione del ciclo nelle donne

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10 000)

- orticaria
- stato di agitazione
- nervosismo
- incapacità a urinare
- aumento dei livelli di prolattina

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15 °C - 25 °C) e nella scatola originale per proteggere il contenuto dalla luce.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Motilium lingual Gastrosan è una compressa orodispersibile che si scioglie rapidamente. Una volta messa sulla lingua, la compressa orodispersibile si scioglie immediatamente e può essere poi inghiottita con la saliva. Non è necessario assumere del liquido per inghiottire le compresse. Dato che le compresse di Motilium lingual Gastrosan a scioglimento rapido si rompono facilmente, non si deve premere attraverso il blister per farle fuoriuscire, perché potrebbero danneggiarsi. Seguire le istruzioni sotto elencate per estrarre le compresse orodispersibili di Motilium lingual Gastrosan dalla confezione blister:

- sollevare la linguetta lungo la linea contrassegnata (Fig. 1)
- asportare completamente la pellicola di rivestimento (Fig. 2)
- piegare la confezione blister (Fig. 3)
- estrarre la compressa orodispersibile (Fig. 4)





Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Motilium lingual Gastrosan?

1 compressa orodispersibile Motilium lingual Gastrosan contiene:

Principi attivi

10 mg di domperidone.

Sostanze ausiliarie

Aspartame (E 951), gelatina, mannitolo (E 421), aroma di menta (contiene Alcol benzilico e Etanolo), polossamero.

Numero dell'omologazione

57672 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Motilium lingual Gastrosan? Quali confezioni sono disponibili?

Disponibile in farmacia senza prescrizione medica a seguito di consulenza personale da parte del farmacista.

Motilium lingual Gastrosan, compresse orodispersibili: confezione da 20 compresse orodispersibili

Titolare dell'omologazione

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH, Risch, Domicilio: Rotkreuz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

