

## **Benzocaine «PD»**

### **Informazione destinata ai pazienti**

Leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di usare questo farmaco.

Questo farmaco vi è stato consegnato personalmente su prescrizione medica. Non datelo quindi ad altre persone, anche se sembrano avere i vostri stessi sintomi. Infatti questo farmaco potrebbe nuocere alla loro salute

Si consiglia di conservare questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere in un secondo momento se necessario.

### **Benzocaine «PD», pasta®**

#### **Che cos'è Benzocaine «PD» e quando si usa?**

La pasta Benzocaine « PD » è una pasta adesiva per l'igiene orale.

Allevia i disturbi dolorosi o le lesioni delle gengive e del palato dovute al postoperatorio o all'utilizzo di protesi dentali.

Ha degli effetti deodoranti e disinfettanti

Conserva le sue qualità adesive poiché si dissolve molto lentamente nella saliva.

La pasta Benzocaine « PD » è rilasciata in farmacia su prescrizione del dentista.

#### **Quando non si può usare Benzocaine «PD»?**

Pasta di Benzocaine "PD" non deve essere utilizzata nelle seguenti situazioni:

in caso di allergia alla benzocaina o ad altro anestetico locale di tipo estere,

in caso di anemia,

in caso di insufficienza epatica o renale,

in caso di metaemoglobinemia congenita o idiopatica.

Tenere lontano dai bambini.

#### **Quando è richiesta prudenza nell'uso di Benzocaine «PD»?**

Gli anestetici locali del tipo benzocaina provocano spesso delle reazioni allergiche. Nel qual caso, sospendere immediatamente il trattamento e informare il vostro dentista. Si prega di informare il proprio dentista o il proprio farmacista se:

-si soffre di un'altra malattia,

-si è allergici o

-si stanno assumendo altri medicinali (anche in automedicazione!)

#### **Si può usare Benzocaine «PD» durante gravidanza o l'allattamento?**

Benzocaine "PD" non deve essere somministrata durante la gravidanza e l'allattamento al seno.

#### **Come usare Benzocaine «PD»?**

Se non diversamente prescritto, pulire una volta al giorno la protesi e applicare all'interno tre fondi di mezzo centimetro di pasta Benzocaine "PD". Rimettere direttamente la protesi senza stendere la pasta, una volta in bocca si stende in maniera uniforme sotto l'effetto della pressione.

In caso di sovradosaggio, rimuovere la protesi, pulire e sciacquare la bocca con acqua tiepida.

Il farmaco è stato concepito per un uso di breve durata. Il trattamento deve estendersi per un periodo massimo di sette giorni.

Non modificare autonomamente il dosaggio prescritto. Rivolgersi al proprio dentista o al proprio farmacista se si ritiene che l'efficacia del farmaco sia troppo bassa o al contrario troppo forte.

L'uso e la sicurezza di pasta Benzocaine "PD" non è stata stabilita fino ad oggi per i bambini e gli adolescenti.

#### **Quali effetti collaterali può avere Benzocaine «PD»?**

L'uso di Benzocaine "PD" pasta può causare i seguenti effetti indesiderati:

- Molto frequenti: Temporanea riduzione della percezione del gusto, papille gustative interessate,
- Casi rari: Allergia al contatto, eritemi, esantemi di tipo allergico

In caso di comparsa di effetti indesiderati si prega di consultare il proprio dentista.

Se si notano effetti collaterali non menzionati in questo foglio illustrativo, si consiglia di informare il proprio dentista, medico o farmacista.



**Di che altro occorre tener conto?**

La pasta Benzocaine « PD » non deve essere utilizzata oltre la data indicata dopo la parola « Scad » sul tubetto.

Conservare a temperatura ambiente (15 ° C - 25 ° C).

Fare attenzione a ben richiudere il tubetto dopo l'uso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare il proprio dentista, medico o farmacista, che hanno informazioni dettagliate rivolte ai professionisti

**Cosa contiene Benzocaine «PD»?**

1 g di pasta Benzocaine « PD » contiene:

Principi attivi:

240 mg benzocaïne/Benzocaine/p-aminobenzoato di etile

5mg sulf. hydroxyquinoléine/Hydroxychinolinsulfat/solf.assichinolinio

5 mg di eugénol/Eugenol/eugenolo

e sia come eccipienti.

Un fondo di mezzo centimetro di pasta, o 50 mg, contiene 12 mg di benzocaïne/Benzocaine/p-aminobenzoato di etile, 0,25 mg di hydroxyquinoléine/Hydroxychinolinsulfat/solf.assichinolinio, 0,25 mg eugénol/Eugenol/eugenolo.

**Numero dell'omologazione**

N° 25164 (Swissmedic)

**Dove è ottenibile Benzocaine «PD»? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia, su prescrizione medica.

Tubetto di 8 g o confezione da 6 tubetti di 8 g.

**Titolare dell'omologazione**

PRODUITS DENTAIRE SA

1800 VEVEY

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell' Aprile 2016 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

