

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement ou a été remis à votre enfant sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous ou votre enfant. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Cosentyx® SensoReady® 150 mg, solution injectable en stylo prêt à l'emploi

Novartis Pharma Schweiz AG

Qu'est-ce que Cosentyx SensoReady et quand doit-il être utilisé?

Selon prescription du médecin.

Cosentyx SensoReady contient le principe actif sécukinumab. Le sécukinumab est un anticorps monoclonal entièrement humain. Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui reconnaissent des protéines spécifiques de l'organisme et se lient à elles.

Cosentyx SensoReady fait partie d'une classe de médicaments appelés inhibiteurs d'interleukine (inhibiteurs d'IL). Ce médicament agit en diminuant l'activité d'une interleukine dont la concentration est élevée dans certaines maladies comme le psoriasis, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite axiale et la maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée).

Cosentyx SensoReady est utilisé pour traiter les maladies inflammatoires suivantes:

- Psoriasis en plaques
- Rhumatisme psoriasique
- Spondylarthrite axiale, y compris maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante) et spondylarthrite axiale non radiographique
- Arthrite juvénile idiopathique (AJI), y compris arthrite liée à l'enthésite (ERA) et rhumatisme psoriasique juvénile (RPJ)
- Maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée)

Psoriasis en plaques

Cosentyx SensoReady est utilisé pour traiter une affection cutanée appelée «psoriasis en plaques». Le psoriasis en plaques provoque une inflammation cutanée. Cosentyx SensoReady atténue l'inflammation et d'autres symptômes de la maladie.

Cosentyx SensoReady est utilisé chez les patients adultes et les patients pédiatriques de plus de 6 ans atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, selon prescription du médecin.

Rhumatisme psoriasique

Cosentyx SensoReady est utilisé pour traiter une maladie appelée «rhumatisme psoriasique». Il s'agit d'une maladie inflammatoire des articulations, qui s'accompagne souvent de psoriasis. Cosentyx SensoReady est utilisé pour réduire les signes et symptômes du rhumatisme psoriasique actif, ralentir les lésions osseuses et articulaires et améliorer la fonction physique.

Cosentyx SensoReady est utilisé chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif qui n'ont pas répondu suffisamment aux traitements conventionnels. Il peut être utilisé seul ou en association avec le médicament méthotrexate.

Spondylarthrite axiale, y compris maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante) et spondylarthrite axiale non radiographique



Cosentyx SensoReady est utilisé pour traiter des maladies appelées «maladie de Bechterew» ou «spondylarthrite ankylosante» et «spondylarthrite axiale non radiographique». Il s'agit de maladies inflammatoires qui touchent surtout la colonne vertébrale; elles causent une inflammation des articulations de la colonne vertébrale. Cosentyx SensoReady est utilisé pour réduire les signes et symptômes de la maladie ainsi que l'inflammation et pour améliorer la fonction physique.

Cosentyx SensoReady est utilisé chez les adultes atteints d'une maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante) active et de spondylarthrite axiale non radiographique active qui n'ont pas répondu suffisamment aux traitements conventionnels.

Arthrite juvénile idiopathique, y compris arthrite liée à l'enthésite (ERA) et rhumatisme psoriasique juvénile (RPJ)

L'arthrite juvénile idiopathique (AJI) est l'affection rhumatismale inflammatoire chronique la plus fréquente chez les enfants et les adolescents. Ce sont principalement les articulations qui sont enflammées. Cosentyx SensoReady est utilisé dans le traitement des deux sous-types de l'AJI, l'arthrite liée à l'enthésite (ERA) et le rhumatisme psoriasique juvénile (RPJ), chez les enfants et les adolescents de plus de 6 ans qui n'ont pas suffisamment répondu aux traitements conventionnels.

Maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée)

Cosentyx est utilisé pour traiter une maladie appelée hidrosadénite suppurée, parfois aussi nommée maladie de Verneuil. Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique et douloureuse de la peau. Les symptômes comprennent des nodules sensibles à la pression et des abcès desquels peut s'écouler du pus. La plupart du temps, certaines zones de la peau sont touchées, notamment sous les seins, sous les aisselles, à l'intérieur des cuisses, dans l'aîne et sur les fesses. Des cicatrices peuvent également se former sur les zones concernées.

Cosentyx permet de réduire le nombre de nodules et d'abcès et de soulager les douleurs qui accompagnent fréquemment cette affection.

Cosentyx est utilisé pour le traitement de la maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée) chez les adultes qui n'ont pas suffisamment répondu à un traitement antibiotique.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Les risques à long terme induits par Cosentyx ne sont pas connus.

Respectez attentivement les instructions de votre médecin.

Quand Cosentyx SensoReady ne doit-il pas être utilisé?

- Si vous ou votre enfant avez eu une réaction allergique sévère au principe actif sécukinumab ou à l'un des excipients contenus dans Cosentyx SensoReady (énumérés dans «Que contient Cosentyx SensoReady?»).
- Si vous pensez être allergique ou si vous pensez que votre enfant est allergique, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser Cosentyx SensoReady.
- Si vous souffrez d'une infection sévère, p.ex. la tuberculose.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Cosentyx SensoReady?

Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser Cosentyx SensoReady:

- Si vous ou votre enfant avez eu récemment une infection ou souffrez d'une infection chronique ou d'infections à répétition.
- Si vous ou votre enfant souffrez ou avez souffert d'une hépatite B.
- Si vous ou votre enfant souffrez d'une maladie inflammatoire de l'intestin (p.ex. maladie de Crohn ou colite ulcéreuse) ou d'autres maladies chroniques de l'intestin, ou avez souffert de telles maladies dans le passé.



- Si vous ou votre enfant avez été vacciné(e) récemment ou devez être vacciné(e) durant le traitement par Cosentyx SensoReady.
- Si vous ou votre enfant présentez une hypersensibilité (allergie) au latex (caoutchouc naturel).

Si un de ces symptômes se manifeste pendant le traitement par Cosentyx, veuillez en informer immédiatement votre médecin ou votre pharmacien:

- Si une éruption cutanée qui démange, une peau sèche, des taches sèches, une peau enflammée, des taches en forme de pièce de monnaie sur la peau [dermatite (y compris eczéma)] apparaissent.
- Si une inflammation sévère de l'ensemble de la surface du corps survient (dermite exfoliative).

Si vous ou votre enfant remarquez un ou plusieurs des symptômes suivants pendant le traitement par Cosentyx SensoReady, arrêtez immédiatement le traitement et informez-en votre médecin ou votre pharmacien:

Signes ou symptômes d'une infection potentiellement grave. Ceux-ci peuvent inclure:

- fièvre, symptômes de type grippal, sueurs nocturnes;
- sensation de fatigue ou essoufflement; toux qui ne passe pas;
- peau chaude, rouge et douloureuse ou éruption cutanée douloureuse avec des cloques;
- sensation de brûlure lors de la miction.

Signes ou symptômes de réaction allergique. Ceux-ci peuvent inclure:

- difficultés à respirer ou à avaler;
- tension artérielle basse pouvant provoquer des vertiges ou des étourdissements;
- gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou du cou.

Prise d'autres médicaments (interactions avec d'autres médicaments, y compris les vaccins et les médicaments biologiques)

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous ou votre enfant avez été récemment vacciné(e) ou allez bientôt être vacciné(e). Pendant l'utilisation de Cosentyx SensoReady, certains types de vaccins (vaccins vivants) ne doivent pas vous être administrés;
- vous ou votre enfant prenez des médicaments dont la dose a été déterminée de façon individuelle, tels que:
 - l'atorvastatine, pour réduire les taux de cholestérol,
 - les inhibiteurs des canaux calciques (p.ex. amlodipine), pour le traitement d'une tension artérielle élevée,
 - la théophylline, pour le traitement de l'asthme,
 - l'acénocoumarol, la phénprocoumone, pour le traitement de maladies thromboemboliques (formation de caillots dans le système circulatoire),
 - la phénytoïne, pour le traitement des convulsions,
 - la cyclosporine, pour la répression du système immunitaire après une greffe,
 - les benzodiazépines, pour le traitement des états d'anxiété;
- vous ou votre enfant prenez/utilisez déjà, avez récemment pris/utilisé ou allez éventuellement prendre/utiliser d'autres médicaments (même en automédication!).

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils et des machines.

Cosentyx SensoReady peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?



L'effet du principe actif de Cosentyx chez les femmes enceintes n'est pas connu. Pour cette raison, Cosentyx ne doit pas être utilisé durant la grossesse. Pendant le traitement par Cosentyx et 5 mois après la dernière administration de Cosentyx, il faut éviter de tomber enceinte en veillant à utiliser des mesures de contraception.

Discutez avec votre médecin avant d'utiliser Cosentyx SensoReady si:

- vous ou votre enfant êtes enceinte, pensez être enceinte ou aimeriez tomber enceinte. Il est déconseillé de prendre Cosentyx SensoReady pendant la grossesse, sauf si le bénéfice l'emporte nettement sur les risques éventuels;
- vous ou votre enfant allaitez ou souhaitez allaiter. On ignore si le principe actif de Cosentyx passe dans le lait maternel. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas allaiter pendant le traitement par Cosentyx SensoReady et pendant 5 mois après la dernière administration de Cosentyx SensoReady.

Comment utiliser Cosentyx SensoReady?

Utilisez toujours Cosentyx SensoReady exactement comme vous l'a indiqué votre médecin. En cas de doute, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou au personnel soignant.

Cosentyx SensoReady est administré en injection sous la peau («sous-cutanée»).

Vous et votre médecin déciderez si vous pouvez vous injecter vous-même Cosentyx SensoReady ou si vous pouvez l'injecter à votre enfant.

Il est important que vous n'essayiez pas de vous l'injecter vous-même ou de l'injecter à votre enfant avant d'avoir reçu une formation de la part de votre médecin, de votre pharmacien ou d'un(e) infirmier(ère). Un soignant peut également vous administrer votre injection de Cosentyx SensoReady ou administrer Cosentyx SensoReady à votre enfant après avoir reçu une formation appropriée.

Vous trouverez des instructions détaillées pour l'injection de Cosentyx SensoReady dans le mode d'emploi ci-joint.

Quelle quantité de Cosentyx SensoReady est administrée?

Pour administrer les doses de 150 mg et de 300 mg, il est possible d'utiliser le stylo prérempli Cosentyx SensoReady 150 mg/1 ml.

Psoriasis en plaques

La dose habituelle recommandée pour les adultes est de 300 mg en injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois. Votre médecin décidera, le cas échéant, si la dose de Cosentyx SensoReady doit être administrée toutes les 2 semaines plutôt que tous les mois, si votre poids corporel est de 90 kg ou plus.

Chaque dose de 300 mg est administrée sous forme de deux injections sous-cutanées de 150 mg chacune. Tout le contenu du stylo prérempli doit être injecté.

Votre médecin décidera si la dose de Cosentyx doit être réduite de 300 à 150 mg, le cas échéant.

Pour les enfants de plus de 6 ans, la dose recommandée est basée sur le poids corporel et elle est administrée sous forme d'injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont aussi administrées une fois par mois. Pour les enfants et les adolescents dont le poids corporel est inférieur à 50 kg, la dose est de 75 mg. Pour les enfants et les adolescents dont le poids corporel est supérieur ou égal à 50 kg, la dose est de 150 mg. Il n'est pas possible d'administrer la dose de 75 mg avec Cosentyx SensoReady. Pour la dose de 75 mg, votre médecin prescrira à votre enfant Cosentyx sous une autre forme d'administration.

Rhumatisme psoriasique



La dose recommandée est de 150 mg en injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois. En fonction de la façon dont vous répondez au traitement, votre médecin peut augmenter la dose à 300 mg.

Chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique qui souffrent également de psoriasis en plaques modéré à sévère, votre médecin pourra adapter la dose recommandée selon les besoins.

Si vous n'avez pas répondu suffisamment à un autre traitement (appelé inhibiteur du facteur de nécrose tumorale [TNF]), votre médecin décidera si vous devez recevoir une dose plus élevée. Dans ces cas, la dose recommandée peut être de 300 mg en injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois.

Chaque dose de 300 mg est administrée en deux injections sous-cutanées de 150 mg chacune.

Maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante)

La dose recommandée est de 150 mg en injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois.

Spondylarthrite axiale non radiographique

La dose recommandée est de 150 mg en injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois.

Arthrite liée à l'enthésite (ERA) et rhumatisme psoriasique juvénile (RPJ), sous-types du rhumatisme psoriasique juvénile (RPJ).

Chez les enfants et les adolescents de plus de 6 ans, la dose recommandée est basée sur le poids corporel. Cosentyx SensoReady est administré en injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois. Pour les enfants et les adolescents dont le poids corporel se situe entre 15 kg et moins de 50 kg, la dose est de 75 mg. Pour les enfants et les adolescents dont le poids corporel est supérieur ou égal à 50 kg, la dose est de 150 mg.

La dose de 75 mg ne peut pas être administrée avec le stylo prérempli de 150 mg. Pour la dose de 75 mg, votre médecin prescrira Cosentyx à votre enfant sous une autre forme d'administration.

Maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée)

La dose recommandée est de 300 mg en injection sous-cutanée une fois par semaine pendant les 5 premières semaines. La 6^e injection est effectuée 1 mois après la 5^e et les injections suivantes (7^e, 8^e, etc.) sont également administrées une fois par mois. Chaque dose de 300 mg est administrée sous forme de deux injections sous-cutanées de 150 mg chacune (c'est-à-dire 2 stylos préremplis). En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter la dose ou arrêter le traitement.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Pendant combien de temps Cosentyx SensoReady doit-il être utilisé?

Il s'agit d'un traitement à long terme. Votre médecin procédera à des contrôles réguliers de votre état de santé ou de l'état de santé de votre enfant pour s'assurer que le traitement produit bien les effets désirés.

Vous devez poursuivre l'utilisation de Cosentyx SensoReady aussi longtemps que votre médecin vous l'indique.

Si vous avez utilisé une quantité de Cosentyx SensoReady plus importante que vous n'auriez dû



Si vous vous êtes administré accidentellement une dose de Cosentyx SensoReady plus élevée que la dose que votre médecin vous a prescrite ou si vous vous êtes administré accidentellement Cosentyx SensoReady plus tôt que ne l'a prescrit votre médecin, veuillez en informer votre médecin.

Si vous avez oublié d'utiliser Cosentyx SensoReady

Si vous avez oublié d'injecter une dose de Cosentyx SensoReady, injectez-la dès que vous y pensez. Parlez-en ensuite à votre médecin pour savoir quand la prochaine dose devra vous être injectée ou être injectée à votre enfant.

Si vous arrêtez d'utiliser Cosentyx SensoReady

L'arrêt de Cosentyx SensoReady est sans danger. Toutefois, si vous arrêtez le traitement, les symptômes du psoriasis, du rhumatisme psoriasique, de la maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante) ou de la maladie de Verneuil (hidrosadénite suppurée) peuvent réapparaître.

Enfants et adolescents (de moins de 18 ans)

L'utilisation de Cosentyx SensoReady n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 6 ans atteints de psoriasis en plaques, car ce médicament n'a pas été étudié dans ce groupe d'âge. L'utilisation de Cosentyx SensoReady n'est pas recommandée pour d'autres indications chez les enfants et les adolescents (de moins de 18 ans), car l'utilisation chez ce groupe de patients n'a fait l'objet d'aucune étude.

Cosentyx n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans atteints d'arthrite liée à l'enthésite (ERA) et de rhumatisme psoriasique juvénile (RPJ), deux sous-types de l'arthrite juvénile idiopathique (AJI), car l'utilisation chez ce groupe de patients n'a fait l'objet d'aucune étude.

Quels effets secondaires Cosentyx SensoReady peut-il provoquer?

Comme tous les médicaments, Cosentyx SensoReady peut provoquer des effets secondaires, bien qu'ils ne surviennent pas chez tous les patients.

Vous devez ARRÊTER d'utiliser Cosentyx SensoReady et consulter immédiatement un médecin si vous ou votre enfant remarquez l'un des signes de réaction allergique suivants:

- difficultés à respirer ou à avaler;
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou du cou;
- fortes démangeaisons cutanées avec éruption rouge ou papules saillantes.

Les autres effets secondaires possibles comprennent ceux mentionnés ci-dessous. La plupart de ces effets secondaires sont d'intensité légère ou modérée. Si ces effets secondaires s'aggravent, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

- infections des voies aériennes supérieures accompagnées de symptômes tels que des maux de gorge et une congestion nasale

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

- boutons de fièvre (herpès buccal)
- diarrhée
- nez qui coule
- maux de tête
- nausées
- fatigue

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

- mycose de la bouche



- infections de l'œsophage causées par des champignons (Candida)
- éruption cutanée qui démange
- signes indiquant un faible nombre de globules blancs, tels que fièvre, maux de gorge ou ulcères de la bouche suite à des infections
- écoulement oculaire avec démangeaisons, rougeur et gonflement
- infections des voies aériennes inférieures
- mycose des pieds
- crampes abdominales et maux de ventre, diarrhée, perte de poids ou sang dans les selles (signes de problèmes intestinaux)
- éruptions cutanées qui démangent, peau sèche, taches sèches, peau enflammée, taches en forme de pièce de monnaie sur la peau [dermatite (y compris eczéma)]

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

- réaction allergique sévère avec choc (réaction anaphylactique)
- rougeur et desquamation de la peau sur des parties du corps plus grandes, qui peuvent démanger ou être douloureuses (dermite exfoliative).
- inflammation des petits vaisseaux sanguins pouvant entraîner une éruption cutanée avec des petites bosses rouges et violettes (vascularite)
- petites cloques qui démangent sur la paume des mains, la plante des pieds ainsi que le bout des doigts et des orteils (eczéma dyshydrosique)

Fréquence inconnue: la fréquence ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles

- mycoses de la peau et des muqueuses (muguet)
- gonflements douloureux et ulcères cutanés (Pyoderma gangraenosum)
- inflammation sévère de l'ensemble de la surface de la peau (dermite exfoliative)
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke)

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas décrits ici, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Vous ne devez pas utiliser le stylo prérempli

- après la date de péremption indiquée sur l'emballage ou sur l'étiquette du stylo prérempli;
- si le liquide contient des particules bien visibles ou s'il est trouble ou nettement marron.

Remarques concernant le stockage

Conserver le médicament hors de portée des enfants.

Conserver le stylo prérempli dans l'emballage d'origine pour le protéger de la lumière.

Conserver au réfrigérateur (2–8 °C). NE PAS CONGELER.

Ne pas secouer.

Si nécessaire, Cosentyx SensoReady peut être stocké en dehors du réfrigérateur à température ambiante (pas au-dessus de 30 °C) pendant 4 jours maximum. S'il n'est pas conservé au frais, le stylo prérempli doit être éliminé au bout de 4 jours.

Remarques complémentaires

Élimination du stylo prérempli



Demandez à votre pharmacien comment éliminer le médicament lorsque vous n'en avez plus besoin.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Cosentyx SensoReady?

Principes actifs

Le principe actif de Cosentyx SensoReady est le sécukinumab. Chaque stylo prérempli contient 150 mg de sécukinumab.

Excipients

Les excipients de Cosentyx SensoReady sont le tréhalose dihydraté, la L-histidine/chlorhydrate d'histidine monohydraté, la L-méthionine, le polysorbate 80 et de l'eau pour préparations injectables.

Numéro d'autorisation

65226 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Cosentyx SensoReady? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Cosentyx SensoReady 150 mg, solution injectable en stylo prérempli est disponible en boîtes de 1 ou 2 stylos préremplis.

Titulaire de l'autorisation

Novartis Pharma Schweiz AG, Risch; domicile: 6343 Rotkreuz

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).


MODE D'EMPLOI DE COSENTYX SENSOREADY, SOLUTION INJECTABLE EN STYLO PRÉREMPLI DE 150 MG

	Cosentyx SensoReady 150 mg en stylo prérempli Solution injectable en stylo prérempli 150 mg de sécukinumab Mode d'emploi destiné aux patients
---	---



	Lisez ENTièrement ces instructions avant de procéder à l'injection. Ces instructions sont destinées à vous aider à vous injecter correctement Cosentyx SensoReady, solution injectable en stylo prérempli de 150 mg. Il est important que vous n'essayiez pas de vous injecter vous-même le médicament ou de l'injecter à une personne dont vous vous occupez avant d'avoir reçu une formation de la part de votre médecin, de votre pharmacien ou d'un(e) infirmier(ère).
--	--

Description du stylo prérempli Cosentyx SensoReady 150 mg

 a. Aiguille b. Protège-aiguille c. Capuchon d. Fenêtre de visualisation e. Couvre-aiguille interne L'illustration montre le stylo prérempli après le retrait du capuchon.	Conservez le stylo prérempli Cosentyx SensoReady emballé au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C. Ne congelez pas le stylo prérempli Cosentyx SensoReady. Ne secouez pas le stylo prérempli Cosentyx SensoReady. Pour que l'injection soit plus agréable, sortez le stylo prérempli Cosentyx SensoReady du réfrigérateur 15 à 30 minutes avant l'injection et laissez-le atteindre la température ambiante.
---	---

Informations de sécurité importantes

Conservez le stylo prérempli emballé **hors de portée des enfants**.

Ne retirez pas le capuchon avant d'être prêt(e) à vous faire l'injection.

N'utilisez pas le stylo prérempli s'il est **tombé** après le retrait du capuchon.

Ce dont vous avez besoin pour votre injection:


Contenu de la boîte: Un nouveau stylo prérempli Cosentyx SensoReady non utilisé. 1 stylo est nécessaire pour une dose de 150 mg et 2 stylos pour une dose de 300 mg. 	Non contenu dans la boîte: - Tampon imbibé d'alcool - Coton ou tampon de gaze - Collecteur de seringues	
---	--	--

Avant l'injection




1. Préparation du stylo prérempli de 150 mg pour l'utilisation:

Sortez la boîte contenant le stylo prérempli Cosentyx SensoReady du réfrigérateur et laissez-la pendant 15 à 30 minutes afin qu'elle atteigne la température ambiante.



2. Contrôles de sécurité importants à réaliser avant l'injection:

- Le liquide doit être limpide. Le liquide peut être incolore à légèrement jaunâtre.
- **Ne pas utiliser** si le liquide contient des particules bien visibles ou s'il est trouble ou nettement marron. Il peut y avoir une petite bulle d'air; cela est normal.
- **Ne pas utiliser** le stylo prérempli après la **date de péremption**.
- **Ne pas utiliser** si le **sceau de sécurité** est endommagé.
- Si l'un de ces contrôles donne lieu à des réclamations, consultez votre pharmacien.



3a. Choix du site d'injection:

- L'endroit recommandé est la région du bas ventre, excepté la zone située dans un rayon de 5 cm autour du nombril.
- Choisissez un endroit différent à chaque injection.
- N'injectez pas le médicament dans des zones où la peau est sensible, lésée, rouge, ou si elle pèle ou est durcie. Évitez les zones présentant des cicatrices ou des vergetures.



3b. Autres sites d'injection:




- Il est également possible d'administrer une injection dans la partie avant de la cuisse ou, lorsqu'un **soignant** ou un **professionnel de santé** administre l'injection, dans la partie extérieure du bras, si le site d'injection recommandé n'est pas approprié.



4. Nettoyage du site d'injection:

- Lavez-vous les mains à l'eau savonneuse chaude.
- Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool en effectuant des mouvements circulaires. Laissez le site d'injection sécher avant l'injection.
- Ne touchez plus la zone nettoyée avant l'injection.



	5. Retrait du capuchon: • Retirez le capuchon uniquement lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser le stylo prérempli. • Dévissez le capuchon dans le sens de la flèche. • Jetez le capuchon après son retrait. N'essayez pas de remettre le capuchon. • Utilisez le stylo prérempli dans les 5 minutes après avoir retiré le capuchon.
	6. Comment tenir le stylo prérempli Cosentyx SensoReady: • Tenez le stylo prérempli à un angle de 90° par rapport au site d'injection nettoyé.  Correct Incorrect
	À LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INJECTION! Pendant l'injection, vous entendrez deux clics sonores distincts. Le premier clic indique le début de l'injection. Quelques secondes plus tard, un deuxième clic indique que l'injection est presque terminée. Maintenez le stylo prérempli fermement appuyé contre votre peau jusqu'à ce qu'un indicateur vert remplisse la fenêtre de visualisation et s'arrête de bouger.
	7. Début de l'injection: • Appuyez fermement le stylo prérempli contre la peau pour commencer l'injection. • Le premier clic indique le début de l'injection. • Maintenez toujours le stylo prérempli fermement appuyé contre la peau. • L'indicateur vert indique la progression de l'injection.





8. Fin de l'injection:

- Attendez le **deuxième clic**. Celui-ci indique que l'injection est **presque** terminée.
- Assurez-vous que l'**indicateur vert** remplit la fenêtre de visualisation et qu'il ne bouge plus.
- Le stylo prérempli peut à présent être retiré.

Après l'injection



9. Assurez-vous que l'indicateur vert remplit la fenêtre de visualisation:

- Cela signifie que le médicament a été injecté. Si l'indicateur vert n'est pas visible, consultez votre médecin.
- Une petite goutte de sang peut apparaître au site d'injection. Vous pouvez appuyer dessus pendant 10 secondes avec un coton ou un tampon de gaze. Ne frottez pas le site d'injection. Si cela est nécessaire, vous pouvez recouvrir le site d'injection d'un petit pansement.



10. Élimination du stylo prérempli Cosentyx SensoReady:

- Jetez le stylo prérempli utilisé dans un collecteur de seringues (c.-à-d. un conteneur résistant à la perforation pouvant être fermé ou un conteneur semblable).
- Le stylo prérempli est conçu pour un usage unique et ne doit pas être réutilisé.

