

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Pefrakehl D3, suppositoires

Médicament homéopathique

Quand Pefrakehl D3, suppositoires est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Pefrakehl D3, suppositoires peut être utilisé sur prescription de votre médecin en cas d'affections mycotiques de la peau et des muqueuses.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Pefrakehl D3, suppositoires peut être utilisé simultanément.

Quand Pefrakehl D3, suppositoires ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser pour les enfants et les adolescences de moins de 18 ans. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Pefrakehl D3, suppositoires peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Pefrakehl D3, suppositoires?

Sauf prescription contraire du médecin chez des adultes, introduire 1 suppositoire dans le rectum 1 fois par jour avant le coucher. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. L'utilisation et la sécurité de Pefrakehl D3, suppositoires n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Pefrakehl D3, suppositoires peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Pefrakehl D3, suppositoires n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en



informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Pefrakehl D3, suppositoires et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Pefrakehl D3, suppositoires?

Un suppositoire contient:

0.2 g Candida parapsilosis D3 trit. (HAB, 6).

Cette préparation contient en outre des excipients.

Numéro d'autorisation

50372 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Pefrakehl D3, suppositoires? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 10 suppositoires.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2007 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

