

Qu'est-ce que l'Hima-Pasta et quand est-elle utilisée?

Hima-Pasta est une pâte utilisée pour la prévention et le traitement des boutons de fièvre des lèvres (herpès labial).

Les boutons de fièvre apparaissant sur les lèvres ou sur le pourtour de la bouche sont causés par les virus de l'herpès. La majeure partie de la population héberge ces virus tout au long de la vie sans qu'ils puissent se manifester, les défenses naturelles de l'organisme les tenant en échec. En cas de déficit des défenses immunitaires (dû à un rhume, à un accès de fièvre, etc.), ces virus peuvent se réactiver. La plupart du temps, la sortie du virus se manifeste par des démangeaisons ou des picotements aux lèvres et sur le pourtour de la bouche.

En règle générale, l'application suffisamment tôt d'Hima-Pasta fait régresser ces symptômes, et les boutons de fièvre ne s'installent pas ou ne se manifestent que faiblement.

Quand Hima-Pasta ne doit-elle pas être utilisée?

En cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants de la préparation.

Hima-Pasta n'est destinée qu'au traitement de la région buccale.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Hima-Pasta?

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez tout de même informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication)!

Hima-Pasta peut-elle être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Hima-Pasta?

L'application d'Hima-Pasta devrait se faire le plus tôt possible, c.-à-d. dès les premiers signes de boutons de fièvre.

Adultes et enfants de plus de 12 ans

Pour le traitement précoce des boutons de fièvre dans la région buccale, on recouvrira les lèvres, 3 à 4 fois par jour, d'une couche mince d'Hima-Pasta.

Les personnes chez qui les boutons de fièvre ont tendance à revenir régulièrement devraient protéger leur région buccale à titre préventif à l'aide d'une couche d'Hima-Pasta avant même l'apparition des boutons de fièvre, surtout avant une excursion en montagne, une randonnée à skis ou un séjour au bord de la mer. Il est recommandé de repasser de la pâte sur les lèvres durant la journée. On répétera l'opération le soir venu.

Lorsque les boutons de fièvre se sont déjà installés, on recouvrira soigneusement toute la région buccale d'Hima-Pasta. Si possible, on renouvellera l'opération 2 fois par jour.

Si les boutons de fièvre ont déjà éclaté, on veillera à ne pas les toucher avec les doigts.

Après chaque application, bien se laver les mains pour éviter de mettre la pâte en contact avec les yeux.

Enfants de moins de 12 ans



L'utilisation et la sécurité d'emploi d'Hima-Pasta n'ont pas encore été systématiquement étudiées chez l'enfant de moins de 12 ans.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Hima-Pasta peut-elle provoquer?

Aucun effet secondaire d'Hima-Pasta n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. On ne saurait toutefois exclure l'apparition de réactions d'hypersensibilité à l'un des composants de la préparation.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ceci est un médicament. Ne pas mettre à la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Hima-Pasta?

Substances actives: 10 mg de sulfate de zinc et 200 mg d'oxyde de zinc par 1 g de pâte.

Adjuvants: propylèneglycol, colorant E 172 (oxyde de fer), agent conservateur chlorure de benzalkonium, ainsi que d'autres adjuvants.

Numéro d'autorisation

52489 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Hima-Pasta? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tubes de 8 g.

Titulaire de l'autorisation

Mundipharma Medical Company, Hamilton/Bermuda, Succursale Bâle.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

