

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento è stato prescritto al suo bambino o gli è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Camilia[®], liquido orale in recipiente monodose

Boiron SA

Medicamento omeopatico

Quando si usa Camilia?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Camilia può essere usato su neonati in caso di disturbi attribuiti alla dentizione. I sintomi legati ad un'eruzione dentaria imminente sono i seguenti: bisogno aumentato di masticare, di tettare e di morsicare, salivazione intensa e irritabilità del neonato.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i sintomi persistono oltre i 3 giorni, o *se appare della febbre*, è necessario consultare un medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Camilia.

Quando non si può assumere Camilia e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Finora non sono note limitazioni d'uso. Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui vostro bambino

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Come usare Camilia?

Salvo diversa prescrizione medica: 1 recipiente monodose, 3 a 6 volte ogni 24 ore durante 3 a 8 giorni, per via orale. Allungare l'intervallo tra una somministrazione e l'altra in caso di miglioramento e cessare la somministrazione alla scomparsa dei sintomi.

Lavarsi le mani prima di usare il medicamento. Per somministrare Camilia, aprire il sacchetto in alluminio, staccare un recipiente monodose dalla stanghetta, aprire il recipiente monodose facendo ruotare il tappo. Mettere il bambino in posizione seduta, versare il contenuto della monodose nella bocca del bambino facendo leggermente pressione sulle pareti della monodose per farne fuoriuscire il contenuto.

Richiudere con precauzione il sacchetto contenente le altre monodosi, ripiegando la parte aperta.

Al fine di somministrare una soluzione sempre sterile, usare una nuova monodose ad ogni utilizzazione.

Non conservare una monodose dopo apertura e gettarla dopo ciascun uso.

Non somministrare una dose doppia per compensare una dose dimenticata. Non somministrare nel naso, nell'occhio e nell'orecchio. Non iniettare.

Se i sintomi persistono oltre i 3 giorni o *se appare della febbre*, è necessario consultare un medico



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Camilia?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Camilia e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Camilia.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura del sacchetto: conservare i recipienti monodose non utilizzati nel sacchetto richiuso e usarli durante un periodo di tempo di 6 mesi.

Dopo l'apertura di un recipiente monodose: il prodotto deve essere usato immediatamente; gettare la monodose dopo l'utilizzo, non conservarla per un'uso ulteriore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Camilia?

Un recipiente monodose di 1 ml di liquido orale contiene:

Principi attivi

Chamomilla vulgaris (Ph.F.) 9 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10) 0.333 ml

Phytolacca decandra (Ph.F.) 5 CH 0.333 ml

Rheum (Ph.F.) 5 CH 0.333 ml

Sostanze ausiliarie

Acqua depurata.

Numero dell'omologazione

59057 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Camilia? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione contenente 10 o 30 recipienti monodose da 1 ml.

Titolare dell'omologazione

BOIRON SA, CH-1754 Avry-sur-Matran



Fabbricante

BOIRON SA, Francia.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

