

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Kinpeygo® 4 mg gélules à libération modifiée

Spirig HealthCare AG

Qu'est-ce que Kinpeygo et quand doit-il être utilisé?

Kinpeygo contient le principe actif budésonide, un corticoïde qui agit principalement localement dans l'intestin pour réduire l'inflammation associée à la néphropathie à immunoglobulines A (IgA) primitive.

Kinpeygo est utilisé dans le traitement de la néphropathie à IgA primitive chez les adultes âgés de 18 ans ou plus.

Quand Kinpeygo ne doit-il pas être pris/utilisé?

Ne prenez jamais Kinpeygo:

- Si vous êtes allergique au budésonide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- Si vous présentez une perte de fonction hépatique jugée «sévère» par votre médecin.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de Kinpeygo ?

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Kinpeygo si

- vous allez subir une intervention chirurgicale.
- vous avez des problèmes hépatiques.
- vous prenez ou avez récemment pris des corticoïdes.
- vous avez récemment eu une infection.
- vous présentez une infection tuberculeuse active ou latente, des infections fongiques, bactériennes, virales systémiques ou parasitaires non traitées, ou un herpès simplex oculaire.
- vous présentez une tension artérielle élevée.
- vous êtes diabétique, ou si une personne de votre famille l'est.
- vous souffrez de fragilisation osseuse (ostéoporose).
- vous présentez des ulcères à l'estomac.
- vous êtes atteint d'un glaucome (augmentation de la pression dans l'œil) ou de cataracte, ou si une personne de votre famille a été atteinte d'un glaucome (augmentation de la pression dans l'œil).

Si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus, vous risquez d'être exposé à un risque accru d'effets indésirables. Votre médecin décidera des mesures appropriées et si vous pouvez tout de même prendre ce médicament.

Si vous avez une vision floue ou d'autres problèmes de vue, contactez votre médecin. Voir la rubrique « Quels effets secondaires Kinpeygo peut-il provoquer ? » pour plus de détails.

Varicelle ou rougeole

Des maladies telles que la varicelle ou la rougeole peuvent être plus graves si vous prenez ce médicament. Si vous n'avez pas encore contracté ces maladies, tenez-vous à l'écart des personnes atteintes de varicelle ou de rougeole pendant que vous prenez ce médicament. Informez votre médecin si vous pensez



que vous avez été infecté par la varicelle ou la rougeole pendant que vous prenez ce médicament.

Lors de la vaccination, il faut tenir compte du fait que la réaction immunitaire et donc la réussite de la vaccination puissent être altérées.

Analyses de la fonction surrénalienne

Kinpeygo peut affecter les résultats des analyses de la fonction surrénalienne (test de stimulation de l'ACTH) prescrits par votre médecin. Informez votre médecin que vous prenez Kinpeygo avant de passer des examens médicaux.

Enfants et adolescents

Kinpeygo ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. L'utilisation de ce médicament chez les enfants de moins de 18 ans n'a pas été étudiée.

Prise de Kinpeygo avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou avez l'intention de prendre tout autre médicament (y compris les médicaments vendus sans ordonnance et les médicaments à base de plantes).

En effet, les gélules de Kinpeygo peuvent affecter le mode d'action de certains médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'action des gélules de Kinpeygo.

En particulier, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants:

- Kétoconazole ou itraconazole – pour traiter les infections causées par un champignon.
- Médicaments contre le VIH appelés « inhibiteurs de protéase », tels que le ritonavir, l'indinavir et le saquinavir.
- Érythromycine – un antibiotique utilisé pour traiter les infections.
- Cyclosporine – utilisée pour supprimer la réponse de votre système immunitaire.
- Carbamazépine – utilisée pour traiter l'épilepsie et les douleurs névralgiques.
- Glycosides cardiaques – tels que la digoxine – des médicaments utilisés pour traiter les affections cardiaques.
- Diurétiques – pour éliminer l'excès de liquide de l'organisme.

Si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus (ou en cas de doute), adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Kinpeygo.

Prise de Kinpeygo avec des aliments et des boissons

Ne mangez pas de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse pendant que vous prenez Kinpeygo. Cet aliment peut affecter l'action du médicament.

Excipients

Kinpeygo contient du saccharose. Veuillez consulter votre médecin avant de prendre Kinpeygo si vous savez que vous souffrez d'une intolérance au sucre.

Rien n'indique à ce jour que ce médicament affecte les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils ou des machines.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

Kinpeygo peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?



Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ne prenez pas ce médicament pendant la grossesse sans avoir consulté votre médecin au préalable.

Ne prenez pas ce médicament si vous allaitez, sauf si vous avez consulté votre médecin. Le budésonide passe dans le lait maternel en petites quantités. Votre médecin vous aidera à décider si vous devez poursuivre le traitement et interrompre l'allaitement ou si vous devez arrêter le traitement pendant la période d'allaitement de votre nourrisson.

Comment utiliser Kinpeygo?

La dose recommandée de Kinpeygo est de 16 mg (4 gélules de Kinpeygo 4 mg) une fois par jour.

Prenez les gélules le matin, au moins une heure avant le repas.

Avalez les gélules entières avec un verre d'eau.

Ne pas ouvrir, écraser ou mâcher les gélules car cela pourrait affecter la libération du médicament. Les gélules sont recouvertes d'un enrobage spécial afin que le médicament soit libéré dans la bonne partie de votre intestin.

Lorsque le traitement doit être interrompu, votre médecin réduira la dose à 8 mg (2 gélules de Kinpeygo 4 mg) une fois par jour pendant les 2 dernières semaines de traitement. Si votre médecin le juge nécessaire, la dose peut ensuite être réduite à 4 mg une fois par jour (1 gélule de Kinpeygo 4 mg) pendant 2 semaines supplémentaires.

Si vous avez pris plus de Kinpeygo que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de Kinpeygo que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin ou pharmacien. Emportez la boîte avec vous.

Si vous avez pris plus de Kinpeygo que vous n'auriez dû pendant une longue période, les effets indésirables possibles mentionnés dans la rubrique « Quels effets secondaires Kinpeygo® peut-il provoquer ? » peuvent survenir.

Si vous avez oublié de prendre Kinpeygo

Si vous oubliez une dose de Kinpeygo, attendez et prenez le médicament le lendemain, comme d'habitude.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Kinpeygo

N'arrêtez pas de prendre Kinpeygo sans en parler au préalable à votre médecin. Si vous arrêtez subitement de prendre le médicament, vous pourriez tomber malade.

L'utilisation et la sécurité de Kinpeygo n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Kinpeygo peut-il provoquer?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Informez votre médecin si vous ressentez l'un des effets indésirables suivants avec ce médicament:

Très fréquent (concerne plus d'une personne sur 10)

- Éruption cutanée ou démangeaisons de la peau
- Acné



- Diminution du taux de potassium dans le sang (hypokaliémie)

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

- Augmentation de la pression artérielle
- Gonflement des bras ou des jambes, tel que le gonflement des chevilles
- Gonflement du visage
- Symptômes du syndrome de Cushing tels qu'un visage dit « lunaire », une pilosité accrue et une prise de poids
- Troubles digestifs
- Crampes musculaires
- Prise de poids
- Diabète sucré
- Augmentation du nombre de globules blancs (détectée par des analyses de sang)

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

- Vision floue

Effets indésirables rapportés lors d'un traitement par un médicament de la même classe ou lors de l'utilisation dans une autre indication avec le même principe actif (encore non rapportés jusqu'ici avec Kinpeygo):

troubles de l'équilibre sodique, accumulation d'eau dans les tissus, troubles hormonaux, maladies psychiques, tremblements, agitation, vision trouble, cataracte, glaucome, palpitations cardiaques, risque accru de coagulation sanguine, inflammations vasculaires, inflammations du pancréas, ulcères gastro-intestinaux, petites hémorragies cutanées, retard de cicatrisation, faiblesse musculaire, perte osseuse (ostéoporose) et modifications osseuses.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Conserver dans l'emballage d'origine et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Kinpeygo?

Principes actifs

Kinpeygo contient du budésonide.

Excipients

Contenu des gélules

Pellets de saccharose et d'amidon, hypromellose, macrogol 400, acide citrique monohydraté, éthylcellulose, triglycérides à chaîne moyenne, acide oléique

Enveloppe des gélules



Hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171), copolymères d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle, talc, sébacate de dibutyle

Encre d'imprimerie

Gomme-laque, oxyde de fer noir (E172).

Numéro d'autorisation

69205 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Kinpeygo? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale.

Kinpeygo 4 mg: flacons de 28 et 120 gélules à libération modifiée du principe actif.

Titulaire de l'autorisation

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

