

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Cocyntal, liquide oral en récipient unidose

Boiron SA

Médicament homéopathique

Quand Cocyntal est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Cocyntal peut être utilisé en cas de ballonnements et de légères crampes abdominales dus aux gaz intestinaux.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Cocyntal peut être pris simultanément.

Quand Cocyntal ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Consultez un médecin si les symptômes s'aggravent et persistent plus de 48 heures, en cas de symptômes concomitants comme des nausées, vomissements, diarrhée ou constipation accrues, de coloration noire des selles, de sang dans les selles ou de la fièvre. Chez les nourrissons et enfants en bas âge, veuillez aussi consulter un médecin si votre enfant a des pleurs inconsolables pendant plus de deux heures ou est dans un état apathique.

Cocyntal ne doit pas être utilisé si vous ou votre enfant êtes allergique à l'un des principes actifs ou autres composants contenus dans ce médicament.

Ne pas administrer dans le nez, l'œil ou l'oreille.

Ne pas injecter.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

Cocyntal peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Cocyntal?

Sauf prescription contraire du médecin:

1 récipient unidose entre les repas, par voie orale. Ne pas dépasser 6 unidoses par jour.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.



La durée du traitement ne doit pas dépasser une semaine.

Se laver les mains avant d'utiliser le médicament.

Pour administrer Cocyntal:

1. Ouvrir le sachet aluminium
2. Détacher un récipient unidose de la barrette
3. Ouvrir le récipient unidose en tournant l'embout
4. Pour les enfants: Mettre l'enfant en position assise.
5. Verser le contenu du récipient unidose dans la bouche en pressant légèrement dessus.
6. Refermer soigneusement le sachet contenant les autres unidoses en repliant le côté ouvert.

Afin d'administrer une solution toujours stérile, utiliser un nouveau récipient unidose lors de chaque utilisation. Ne pas conserver un récipient unidose après ouverture. Le récipient unidose doit être jeté après chaque usage.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Cocyntal peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Cocyntal et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Cocyntal n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Après ouverture du sachet : conserver les récipients unidoses non utilisés dans le sachet refermé et les utiliser dans les 3 mois.

Après ouverture d'un récipient unidose :

- Le produit doit être utilisé immédiatement.
- Jeter l'unidose après utilisation/ouverture.
- Ne pas le conserver pour une utilisation ultérieure.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Cocyntal?



Un récipient unidose de 1 ml de liquide oral contient:

Principes actifs

Carbo vegetabilis (Ph.Fr.) 5 CH (Ph.Eur.Hom.3.2.3) 0.333 ml

Colocynthis (Ph.Fr.) 9 CH 0.333 ml

Cuprum metallicum (Ph.Eur.Hom.) 5 CH (Ph.Eur.Hom.3.2.3) 0.333 ml

Excipients

Eau purifiée.

Numéro d'autorisation

69654 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Cocyntal? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 20 ou 30 récipients unidoses de 1 ml.

Titulaire de l'autorisation

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabricant

BOIRON SA – France

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

