

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Cocyntal, liquido orale in recipiente unidose

Boiron SA

Medicamento omeopatico

Quando si usa Cocyntal?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Cocyntal può essere usato in caso di gonfiori e lievi crampi addominali dovuti ai gas intestinali.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Cocyntal.

Quando non si può assumere Cocyntal e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Consulti un medico se i sintomi si aggravano o persistono più di 48 ore, in caso di sintomi concomitanti come nausea, vomito, aumento di diarrea o stitichezza, di colorazione nera delle feci, di presenza di sangue nelle feci o di febbre. Per i lattanti o i bambini in bassa età voglia consultare un medico in caso di pianti inconsolabili durante più di due ore o in caso di stato apatico.

Cocyntal non deve essere usato se lei o il suo bambino siete allergici ad uno dei principi attivi o ad altri costituenti che si trovano in questo medicamento.

Non somministrare nel naso, nell'occhio o nell'orecchio.

Non iniettare.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- utilizza altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!)

Si può assumere Cocyntal durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Cocyntal?

Salvo altra prescrizione del medico:

1 recipiente unidose tra un pasto e l'altro, per via orale. Non oltrepassare 6 unidosi al giorno. Allungare l'intervallo fra una somministrazione e l'altra in caso di miglioramento e cessare la presa in caso di scomparsa dei sintomi. La durata di trattamento non deve oltrepassare una settimana.

Lavarsi le mani prima di utilizzare il medicamento.



Per somministrare Cocyntal:

1. Aprire il sacchetto in alluminio
2. Staccare un recipiente unidose dalla barretta
3. Aprire il recipiente ruotando il puntale
4. Per i bambini: mettere i bambini in posizione seduta.
5. Versare il contenuto di un recipiente unidose nella bocca schiacciandolo leggermente.
6. Richiudere con precauzione il sacchetto contenente le altre unidosi ripiegando la parte aperta.

Al fine di somministrare una soluzione sempre sterile, usare un nuovo recipiente unidose ad ogni utilizzo. Non conservare un recipiente unidose dopo apertura. Il recipiente unidose deve essere gettato dopo ogni utilizzazione.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Cocyntal?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Cocyntal e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Cocyntal.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura della bustina: Conservare i recipienti unidose non utilizzati nel sacchetto richiuso e utilizzarli in un lasso di tempo di 3 mesi.

Dopo apertura di un recipiente unidose:

- il prodotto deve essere utilizzato immediatamente
- gettare l'unidose dopo utilizzo/apertura
- non conservarla per un uso ulteriore

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Cocyntal?

Un recipiente unidose da 1 ml di liquido orale contiene:

Principi attivi

Carbo vegetabilis (Ph.Fr.) 5 CH (Ph.Eur.Hom.3.2.3) 0.333 ml



Colocynthis (Ph.Fr.) 9 CH 0.333 ml

Cuprum metallicum (Ph.Eur.Hom.) 5 CH (Ph.Eur.Hom.3.2.3) 0.333 ml

Sostanze ausiliarie

Acqua purificata

Numero dell'omologazione

69654 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Cocyntal? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 20 o 30 recipienti unidose da 1 ml

Titolare dell'omologazione

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabbricante

Boiron SA - France

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

