

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mundisal® Gel

iNova Pharmaceuticals (Switzerland) AG

Che cos'è il gel Mundisal e quando si usa?

Il gel Mundisal viene utilizzato in caso di infiammazioni e ferite dolorose della bocca, disturbi della dentizione nei lattanti e bambini piccoli, punti di pressione e ferite provocate da protesi e apparecchi ortodontici (p.es. per correggere i difetti di allineamento dei denti).

Dopo l'applicazione locale del gel Mundisal, il principio attivo (salicilato di colina) penetra rapidamente attraverso la mucosa della bocca. L'effetto analgesico e antinfiammatorio si manifesta nell'arco di 5 minuti e dura per 2 a 3 ore.

I bambini e gli adolescenti con febbre in relazione ad una malattia virale devono usare il gel Mundisal solo dietro prescrizione medica e solo come medicamento di seconda scelta (vedi «Quando è richiesta prudenza nell'uso del gel Mundisal?»).

Quando non si può usare il gel Mundisal?

Non deve utilizzare il gel Mundisal se risulta ipersensibile (allergico/a) ai salicilati o a un altro componente.

Se soffre di un'ulcera attiva dello stomaco o del duodeno non deve usare il gel Mundisal.

Per motivi di sicurezza non è consentito usare il gel Mundisal nel terzo trimestre di gravidanza.

Quando è richiesta prudenza nell'uso del gel Mundisal?

In caso di febbre elevata o se entro una settimana non sopraggiunge alcun miglioramento, deve consultare un medico.

I bambini e gli adolescenti con febbre in relazione a influenza, varicella o altre malattie virali possono usare il gel Mundisal solo seguendo le istruzioni del medico e solo come medicamento di seconda scelta. Se, in presenza di queste malattie o dopo il loro miglioramento, dovessero insorgere disturbi dello stato di coscienza accompagnati da vomito, occorre consultare immediatamente il medico.

L'uso concomitante del gel Mundisal può potenziare l'effetto dei medicinali anticoagulanti.

Questo medicamento contiene 60 mg di alcol (etanolo) per applicazione di 1 cm di gel.

Pertanto, non sono da aspettarsi effetti sulla capacità di condurre veicoli o manovrare macchinari.

Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare il gel Mundisal durante la gravidanza o l'allattamento?

Se lei è incinta o desidera una gravidanza oppure se allatta, dovrebbe utilizzare il gel Mundisal esclusivamente dietro prescrizione del medico. Non deve utilizzare il gel Mundisal nell'ultimo trimestre della gravidanza.

Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad utilizzare medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, al farmacista o al droghiere.

Come usare il gel Mundisal?



Salvo diversa prescrizione del medico: applicare 1 cm circa di gel (corrisponde a 15 mg circa di salicilato di colina) con un dito pulito sul punto dolorante e massaggiare leggermente.

Secondo l'intensità dei dolori, l'applicazione può essere ripetuta ogni 2 a 3 ore, ma non per oltre 8 a 10 volte al giorno.

L'applicazione del gel Mundisal non va prolungata più del necessario.

Applicare nei lattanti e bambini piccoli la metà della dose normale (0,5 cm di gel) per un massimo di 4 volte al giorno.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il gel Mundisal?

La base del gel Mundisal contiene alcol. Pertanto, quando lo si applica sulla pelle o sulla mucosa ferita può provocare un leggero bruciore di carattere passeggero.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

In casi molto rari sono stati riscontrati gonfiore della lingua, arrossamento locale e orticaria.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura, il gel Mundisal si conserva per 12 mesi.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15–25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene il gel Mundisal?

1 g di gel per mucosa orale contiene

Principi attivi

87,1 mg di salicilato di colina

Sostanze ausiliarie

Acido edetico, ipromellosa, glicerolo, etanolo 96%, anice essenza, mentolo, sodio ciclamato, acqua purificata.

Contiene 43% vol. di alcol

Numero dell'omologazione

33332 (Swissmedic)

Dove è ottenibile gel Mundisal? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubetti da 10 g.

Titolare dell'omologazione

iNova Pharmaceuticals (Switzerland) AG, Zug.



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

