

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Taltz® 80 mg stylo prérempli

Eli Lilly (Suisse) SA

Qu'est-ce que Taltz et quand doit-il être utilisé?

Taltz contient le principe actif ixekizumab. L'ixekizumab est un anticorps monoclonal. Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui reconnaissent certaines autres protéines du corps humain et se lient à elles.

Taltz appartient à un groupe de médicaments appelé inhibiteurs de l'interleukine (IL). Ce médicament agit en neutralisant l'activité d'une interleukine appelée IL-17A, dont le taux est élevé dans des maladies comme le psoriasis en plaques et l'arthrite psoriasique.

Psoriasis en plaques

Taltz est utilisé sur prescription du médecin pour traiter une affection cutanée appelée «psoriasis en plaques» qui est causée par une inflammation cutanée. Taltz réduit l'inflammation et d'autres symptômes de la maladie tels que la desquamation, les démangeaisons et la douleur.

Taltz est utilisé chez les adultes et chez les enfants et adolescents (dès 6 ans, avec un poids corporel d'au moins 25 kg) atteints d'une forme modérée à sévère de psoriasis en plaques, n'ayant pas répondu ou n'ayant pas toléré d'autres traitements ou chez qui ces traitements sont contre-indiqués.

Arthrite psoriasique

Taltz est indiqué pour traiter une affection appelée «arthrite psoriasique». Il s'agit d'une maladie inflammatoire des articulations, souvent accompagnée d'une maladie de la peau, le psoriasis en plaques.

Taltz réduit les signes et les symptômes de la maladie et améliore la fonction physique (capacité à réaliser les activités quotidiennes habituelles).

Taltz est utilisé sur prescription médicale, seul ou en association avec un autre médicament (antirhumatismal) chez les patients adultes atteints d'arthrite psoriasique, n'ayant pas suffisamment répondu à un traitement conventionnel.

Spondylarthrite axiale

Taltz est utilisé pour traiter une affection appelée «spondylarthrite axiale». Il s'agit d'une maladie inflammatoire qui affecte principalement la colonne vertébrale et provoque une inflammation des articulations vertébrales. La spondylarthrite axiale peut survenir avec des signes radiologiques (appelée «spondylarthrite ankylosante») ou sans signes radiologiques (appelée «spondylarthrite axiale non radiographique»).

Taltz est utilisé sur prescription médicale, seul ou en association avec d'autres médicaments pour le traitement de cette maladie, chez les patients adultes atteints de spondylarthrite axiale, n'ayant pas suffisamment répondu ou n'ayant pas toléré un traitement conventionnel.

Quand Taltz ne doit-il pas être utilisé?

N'utilisez pas Taltz si vous êtes allergique au principe actif ixekizumab ou à l'un des excipients contenus dans Taltz (voir « Que contient Taltz? »).

Taltz ne doit pas être administré si vous souffrez d'une infection grave, comme p.ex la tuberculose.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Taltz?



Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Taltz:

- si vous avez actuellement une infection ou si vous avez une infection chronique ou des infections répétées.
- si vous avez la tuberculose.
- si vous avez actuellement une maladie cardiovasculaire ou si vous avez eu par le passé une maladie cardiovasculaire (p.ex. une crise cardiaque).
- si vous souffrez d'une maladie inflammatoire de l'intestin (comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse). Veuillez informer immédiatement votre médecin si vous avez des douleurs abdominales, des crampes abdominales, de la diarrhée, une perte de poids ou du sang dans les selles.
- si vous avez été récemment vacciné(e) ou si vous prévoyez de vous faire vacciner pendant le traitement avec Taltz.
- si vous suivez un autre traitement contre le psoriasis en plaques ou l'arthrite psoriasique (médicament ou photothérapie aux rayons ultraviolets).
- si vous présentez un risque de dépression.

Taltz peut potentiellement provoquer des effets indésirables graves incluant des infections et des réactions allergiques. Pendant le traitement avec Taltz, vous devez rester attentif à l'apparition de symptômes évoquant ces affections. En cas d'apparition des signes d'infection grave ou de réaction allergique ci-dessous, vous devez *arrêter immédiatement d'utiliser Taltz* et informer votre médecin ou solliciter une aide médicale.

Signes d'une infection potentiellement grave: fièvre, symptômes grippaux, sueurs nocturnes, sensation de fatigue ou essoufflement; toux qui ne passe pas, chaleur, rougeurs et douleurs cutanées ou éruption cutanée douloureuse avec des vésicules, sensation de brûlure quand vous urinez.

Signes d'une réaction allergique: difficultés à respirer ou à avaler, tension artérielle faible pouvant provoquer des vertiges ou des évanouissements, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou du cou.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose de 80 mg, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez/utilisez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

Taltz peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Il est préférable d'éviter l'utilisation de Taltz pendant la grossesse. Les effets de ce médicament chez la femme enceinte ne sont pas connus. Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, parlez à votre médecin avant de prendre ce médicament. Pendant le traitement avec Taltz et pendant au moins les 10 semaines suivant la dernière administration de Taltz, vous devez éviter de tomber enceinte en utilisant une méthode de contraception adéquate.

On ne sait pas si le principe actif de Taltz passe dans le lait maternel. En raison de possibles préjudices pour l'enfant allaité, il est recommandé de ne pas allaiter pendant le traitement avec Taltz et pendant au moins 10 semaines après la dernière dose. Si vous allaitez ou si vous prévoyez d'allaiter, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. Vous et votre médecin déciderez s'il vaut mieux allaiter ou utiliser Taltz. Vous ne devez pas faire les deux simultanément.

Comment utiliser Taltz?

Utilisez toujours ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin, de votre pharmacien ou du personnel soignant. Demandez à votre médecin, votre pharmacien ou au personnel soignant si vous n'êtes pas tout-à-fait certain de comment vous devez utiliser le médicament.

Taltz est administré par injection sous la peau (injection sous-cutanée). Vous et votre médecin déciderez si vous pouvez vous administrer Taltz vous-même.



Il est important de ne pas essayer de vous injecter vous-même ce médicament si vous n'avez pas été formé par votre médecin, votre pharmacien ou le personnel soignant. Un soignant peut également vous administrer Taltz après avoir suivi une formation adaptée.

Lisez soigneusement le manuel d'utilisation du stylo prérempli avant d'utiliser Taltz.

Quelle est la quantité de Taltz à administrer et quelle est la durée du traitement ?

Chaque stylo prérempli est à usage unique et contient une dose de Taltz de 80 mg. Toute la quantité contenue dans le stylo prérempli doit être injectée.

Psoriasis en plaques chez les adultes

La première dose est de 160 mg (deux injections de 80 mg) administrée par injection sous-cutanée. Ces deux injections vous seront administrées par votre médecin ou le personnel soignant.

Après la première dose, vous recevrez une dose de 80 mg (une injection) aux semaines 2, 4, 6, 8, 10 et 12 et ensuite une dose de 80 mg (une injection) toutes les 4 semaines.

Si vous pesez moins de 100 kg, votre médecin pourra décider d'un dosage alternatif et vous administrer une dose de 80 mg toutes les 4 semaines à partir de la semaine 2.

Psoriasis en plaques chez les enfants et les adolescents (dès 6 ans)

Enfants et adolescents dès 6 ans pesant plus de 50 kg:

Au début du traitement, une dose initiale unique de 160 mg (deux injections de 80 mg) est administrée en injection sous-cutanée. Dès la 4^{ème} semaine après le premier traitement et ensuite toutes les 4 semaines, une dose de 80 mg (une injection de 80 mg) est administrée.

Enfants et adolescents dès 6 ans pesant entre 25 kg et 50 kg:

Au début du traitement, une dose initiale unique de 80 mg (une injection de 80 mg) est administrée en injection sous-cutanée. Dès la 4^{ème} semaine après le premier traitement et ensuite toutes les 4 semaines, une dose de 40 mg est administrée. Les doses de 40 mg ne peuvent pas être administrées avec le stylo prérempli, mais seulement avec la seringue préremplie. Veuillez vous référer à l'information destinée aux patients de Taltz[®] seringue préremplie pour le traitement des enfants dès 6 ans pesant entre 25 kg et 50 kg.

Taltz est administré à votre enfant par le médecin ou le personnel soignant.

Arthrite psoriasique

La première dose est de 160 mg (deux injections de 80 mg) administrée par injection sous-cutanée. Ces deux injections vous seront administrées par votre médecin ou le personnel soignant.

Après la première dose, vous recevrez une dose de 80 mg (une injection) toutes les 4 semaines.

Si vous souffrez à la fois d'arthrite psoriasique et de psoriasis en plaques modéré à sévère, le médecin vous prescrira le dosage pour le psoriasis en plaques.

Spondylarthrite axiale

La dose recommandée est de 80 mg (une injection) en injection sous-cutanée toutes les 4 semaines. Pendant le traitement par Taltz, votre médecin peut continuer à vous prescrire d'autres anti-rhumatismaux modificateurs de la maladie conventionnels tels que la sulfasalazine, les corticostéroïdes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les analgésiques.

Taltz est un traitement au long cours. Votre médecin surveillera régulièrement l'évolution de votre maladie pour vérifier que le traitement produit l'effet attendu.

Si vous avez utilisé plus de Taltz que vous n'auriez dû

Si vous avez par inadvertance reçu trop de Taltz ou si la dose a été reçue plus tôt que prescrit par votre médecin, prévenez votre médecin.



Si vous avez oublié d'utiliser Taltz

Si vous avez oublié de vous injecter une dose de Taltz, rattrapez-la dès que vous y pensez. Demandez ensuite à votre médecin quand vous devez vous injecter la prochaine dose.

Enfants et adolescents

L'expérience chez les enfants et adolescents dès 6 ans atteints de psoriasis en plaques est limitée au-delà d'un an de traitement. Taltz n'est pas recommandé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 6 ans dans le traitement du psoriasis en plaques parce que l'utilisation dans ce groupe d'âge n'a pas été étudiée.

Taltz n'est pas recommandé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans dans le traitement de l'arthrite psoriasique et de la spondylarthrite axiale parce que l'utilisation dans ce groupe d'âge n'a pas été étudiée.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Taltz peut-il provoquer?

Effets secondaires graves

Arrêtez d'utiliser Taltz et informez *immédiatement* votre médecin ou sollicitez une aide médicale si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants. Votre médecin décidera si et quand vous pouvez reprendre le traitement:

Infection potentiellement grave: les signes peuvent inclure:

- fièvre, symptômes pseudo-grippaux, sueurs nocturnes;
- sensation de fatigue ou essoufflement, toux persistante;
- peau chaude, rouge et douloureuse, ou éruption cutanée douloureuse avec cloques.

Réaction allergique grave: les signes peuvent inclure:

- difficultés à respirer ou à avaler;
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge;
- démangeaisons sévères de la peau avec une éruption cutanée rouge ou des boutons (urticaire).

Les effets secondaires suivants peuvent survenir pendant l'utilisation de Taltz. La plupart sont d'intensité légère à modérée.

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

Infections des voies respiratoires supérieures accompagnées de symptômes tels que mal de gorge et nez bouché (rhinopharyngite), réactions au site d'injection (p.ex. rougeur, douleur).

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Mycose cutanée, herpès sur la bouche, la peau ou les muqueuses, mycose dans la bouche, nez qui coule, grippe, sécrétion oculaire avec démangeaisons, rougeur et gonflement (conjonctivite), douleurs à l'arrière de la gorge, nausées, diarrhée, urticaire, augmentation des valeurs hépatiques dans le sang.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Mycose dans l'œsophage, signes évocateurs d'un faible taux de globules blancs (neutropénie) comme fièvre, maux de gorge ou aphtes dus à des infections, faible taux de plaquettes (thrombocytopénie), réaction anaphylactique (allergique) (voir les signes sous «*Réaction allergique grave*» ci-dessus), maladie inflammatoire de l'intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse, voir «*Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Taltz?*»), eczéma dyshidrotique (petites cloques qui démangent sur les mains et les pieds).

Les effets secondaires rapportés chez les enfants et les adolescents sont globalement similaires à ceux des adultes.



Chez les enfants et adolescents, des réactions d'hypersensibilité (voir «*Effets secondaires graves*», «*Réaction allergique grave*» ci-dessus) ont cependant été rapportés très fréquemment. Des signes évocateurs d'un faible taux de globules blancs (neutropénie) comme fièvre, maux de gorge ou aphtes dus à des infections et un eczéma, ainsi qu'une maladie de l'intestin (maladie de Crohn) ont été rapportés fréquemment. Des douleurs dans la poitrine ou difficultés respiratoires ou spasmes des voies respiratoires (bronchospasme) ont été rapportés occasionnellement.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Stocker au réfrigérateur (2–8 °C). Conserver dans l'emballage original, afin de protéger le contenu de la lumière.

Ne pas congeler. Taltz ne doit pas être utilisé s'il a été congelé.

Stockage temporaire : lorsque la réfrigération n'est pas possible, vous pouvez conserver votre stylo prérempli jusqu'à un total de 5 jours à une température inférieure à 30°C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Chaque stylo prérempli est à usage unique.

Ne pas agiter.

Ne pas utiliser si la solution contient des particules ou si elle est trouble et/ou de couleur marron.

Le manuel d'utilisation du stylo prérempli doit être suivi scrupuleusement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Taltz?

Principes actifs

Chaque stylo prérempli contient 80 mg d'ixekizumab comme principe actif dans 1 ml de solution pour injection.

Excipients

Saccharose, polysorbate 80, eau pour préparation injectable. De l'hydroxyde de sodium peut avoir été ajouté pour ajuster le pH.

Numéro d'autorisation

65907 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Taltz? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 1 stylo prérempli.

Titulaire de l'autorisation



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Manuel d'utilisation

Taltz®

Ixekizumab 80 mg

Solution injectable en stylo prérempli



Veuillez lire la notice d'emballage (information destinée aux patients) et ce manuel d'utilisation COMPLETEMENT avant d'utiliser votre stylo prérempli Taltz.


AVANT D'UTILISER VOTRE STYLO PREREMPLI:

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le stylo prérempli contient 1 dose de Taltz (80 mg). Le stylo prérempli est à USAGE UNIQUE EXCLUSIVEMENT. Toute la quantité contenue dans le stylo prérempli doit être injectée.
- Certaines parties du stylo prérempli sont en verre. Manipulez-le avec précaution. Si vous le faites tomber sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez un nouveau stylo prérempli pour votre injection.
- Votre médecin, votre pharmacien ou le personnel soignant pourra vous aider à choisir la partie du corps où injecter votre dose. Pour vous aider à choisir la partie du corps qui convient le mieux pour injecter votre dose, vous pouvez aussi lire la section «PREPARATION» de ce manuel d'utilisation.
- Si vous avez des troubles de la vision ou de l'ouïe, n'utilisez pas le stylo sans l'aide d'une personne formée à l'utilisation du stylo prérempli Taltz.

Description du stylo prérempli








1	PREPARATION	
1a	Sortez le stylo prérempli du réfrigérateur. Laissez le capuchon de la base jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection. Attendez 30 minutes pour laisser le stylo prérempli se réchauffer à température ambiante avant de l'utiliser. Cela rend le médicament plus facile à injecter. NE mettez PAS le stylo prérempli au micro-ondes, sous l'eau chaude ou à la lumière directe du soleil. NE PAS congeler le stylo prérempli. Si le stylo prérempli a été congelé, ne l'utilisez pas. NE PAS agiter le stylo prérempli.	 30 minutes




1b	Rassemblez les éléments nécessaires à l'injection: • 1 compresse imbibée d'alcool • 1 morceau de coton ou de gaze • 1 conteneur à aiguilles pour y jeter le stylo prérempli
1c	Examinez le stylo prérempli. Vérifiez l'étiquette. Assurez-vous que le nom TALTZ figure sur l'étiquette. Assurez-vous également que le médicament n'est pas périmé. La solution injectable à l'intérieur du stylo doit être limpide. Sa couleur peut varier d'incolore à légèrement jaune. Dans les cas suivants, N'UTILISEZ PAS le stylo et jetez-le selon les recommandations: • la date de péremption du stylo est dépassée. • le stylo semble abîmé. • la solution injectable est trouble, de couleur marron ou contient des particules.
1d	Lavez-vous les mains avant de procéder à l'injection du médicament.
1e	Choisissez le site d'injection. Vous pouvez effectuer l'injection dans le ventre (abdomen), la cuisse ou l'arrière de votre bras. L'injection dans le bras doit être effectuée par une autre personne. N'injectez PAS dans des zones où la peau est sensible, blessée, rouge ou dure, ou présente des cicatrices ou des vergetures. Ne faites PAS l'injection à moins de 2,5 cm autour du nombril. Alternez les sites d'injection. N'injectez PAS le produit toujours exactement au même endroit. Par exemple, si votre dernière injection a été faite dans la cuisse gauche, vous <i>Discutez avec votre médecin, votre pharmacien ou le personnel soignant de quelle partie du corps est la plus appropriée pour l'injection de votre</i>



		pouvez faire l'injection suivante dans la cuisse droite, le ventre ou à l'arrière de l'un des deux bras.
	dose.	
1f	Préparez votre peau. Nettoyez votre peau avec une compresse imbibée d'alcool. Laissez sécher le site d'injection avant de procéder à l'injection du médicament.	

2	INJECTION	
2a		Vérifiez que le stylo prérempli est verrouillé. Laissez le capuchon de la base jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection. NE touchez PAS l'aiguille. Enlevez le capuchon de la base en le tournant. Jetez le capuchon. Vous ne devez pas remettre le capuchon de la base en place - vous risqueriez d'abîmer l'aiguille ou de vous blesser accidentellement.
2b	 <i>Injection dans le ventre, la cuisse ou l'arrière du bras</i>	Placez la base transparente du stylo prérempli bien à plat fermement sur votre peau.
2c		Maintenez la base sur votre peau, puis tournez la bague de sécurité en position de déverrouillage. Vous êtes maintenant prêt pour l'injection.



	<i>Injection dans le ventre, la cuisse ou l'arrière du bras</i>	
2d		Appuyez sur le bouton d'injection vert. Vous devez entendre un clic fort. Maintenez fermement la base transparente du stylo prérempli contre votre peau. Vous devez entendre un deuxième clic fort environ 5-10 secondes après le premier clic. Le deuxième clic indique que l'injection est terminée et que l'aiguille s'est retirée. Vous verrez aussi que le piston gris se trouve en haut de la base transparente du stylo. Retirez le stylo prérempli de votre peau. Appuyez avec un morceau de coton ou de gaze sur le site d'injection. NE frottez PAS le site d'injection pour ne pas provoquer d'ecchymoses. Il peut y avoir un léger saignement. C'est normal.
	<i>Injection dans le ventre, la cuisse ou l'arrière du bras</i>	

3	FIN	
3a		Elimination du stylo prérempli. NE remettez PAS le capuchon en place. Jetez le stylo prérempli dans un conteneur à aiguilles ou selon les recommandations de votre médecin, de votre pharmacien ou du personnel soignant.
Lorsque vous jetez le stylo prérempli et le conteneur à aiguilles:		
• Ne recyclez pas le conteneur à aiguilles quand il est plein. • Demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou au personnel soignant comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus.		



Conseils de sécurité	
• Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour utiliser le stylo prérempli, contactez votre médecin, votre pharmacien ou le personnel soignant.	
• Tenez le stylo prérempli et le conteneur à aiguilles hors de la vue et de la portée des enfants. • Si vous n'avez pas de conteneur à aiguilles, demandez à votre médecin, votre pharmacien ou au personnel soignant où vous pouvez vous en procurer un.	
Foire aux questions	
Q.	Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans le stylo prérempli?
R.	Il est normal que le stylo prérempli contienne des bulles d'air. Taltz est injecté sous votre peau (injection sous-cutanée). La présence de bulles d'air ne pose pas de problème pour ce type d'injection. Cela n'est pas dangereux et n'a pas d'effet sur votre dose.
Q.	Que faire s'il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon de la base?
R.	La présence d'une goutte de liquide au bout de l'aiguille est normale. Cela n'est pas dangereux et n'a pas d'effet sur votre dose.
Q.	Comment faire si j'ai déverrouillé le stylo prérempli et appuyé sur le bouton vert d'injection avant de retirer le capuchon de la base?
R.	Ne retirez pas le capuchon de la base. Contactez votre médecin, votre pharmacien ou le personnel soignant.
Q.	Faut-il maintenir le bouton d'injection enfoncé jusqu'à la fin de l'injection?
R.	Ce n'est pas nécessaire mais peut vous aider à maintenir le stylo prérempli bien à plat contre votre peau.
Q.	Que dois-je faire si l'aiguille ne se rétracte pas après l'injection?
R.	Ne touchez pas l'aiguille et ne remettez pas le capuchon de la base. Conservez le stylo dans un endroit sûr et contactez votre médecin, votre pharmacien ou le personnel soignant.
Q.	J'ai entendu plus de deux clics pendant l'injection, deux forts et un plus faible.



	L'injection a-t-elle été complète?
R.	Certains patients peuvent entendre un petit clic juste avant le deuxième clic fort. Ceci correspond au fonctionnement normal du stylo prérempli. Ne retirez pas le stylo prérempli de votre peau avant d'avoir entendu le deuxième clic fort.
Q.	Comment savoir si l'injection est terminée?
R.	Après avoir appuyé sur le bouton d'injection vert, vous devez entendre deux clics forts. Le deuxième clic indique que l'injection est terminée. Vous verrez également que le piston gris se trouve en haut de la base transparente du stylo.
Si vous avez des questions ou pour de plus amples informations sur Taltz	
Il est important de savoir comment injecter votre médicament de manière correcte et en toute sécurité. Si vous avez des questions sur le stylo prérempli Taltz, adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou au personnel soignant.	

