

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Uriconorm® 100mg/300mg, compresse

Streuli Pharma AG

Che cos'è Uriconorm e quando si usa?

Uriconorm abbassa il tasso dell'acido urico nel sangue e nell'urina. Esso viene impiegato in caso di gotta, cioè in caso di deposito di cristalli di acido urico nella pelle, nelle articolazioni e nei reni, come pure nel caso di altre malattie che causano un tale aumento del tasso dell'acido urico nel sangue da richiedere una terapia.

Uriconorm può essere assunto solo su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Il tasso dell'acido urico nel sangue troppo elevato è dovuto a un disturbo del metabolismo che può venire causato da diversi fattori, per. es. da un'alimentazione eccessiva. È quindi necessario mantenere un peso ideale e provvedere ad un'alimentazione mista e variata. Da evitare sono l'alcol e le interiora. In caso di calcoli renali è necessario bere molto.

Quando non si può assumere/usare Uriconorm?

In caso di ipersensibilità accertata al principio attivo allopurinolo o ad una delle sostanze ausiliarie di Uriconorm.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Uriconorm?

In caso di grave malattia renale e/o epatica nota, al fine di trovare la posologia più adatta, è necessaria estrema prudenza e uno stretto controllo da parte del medico.

In concomitanza con l'assunzione di allopurinolo sono state osservate gravi eruzioni cutanee (reazione da ipersensibilità multiorgano, sindrome di Stevens-Johnson, necrosi epidermica tossica). Spesso le eruzioni sono accompagnate da infiammazioni in bocca, alla faringe, al naso, ai genitali così come da congiuntivite (occhi rossi e gonfi). Queste eruzioni cutanee gravi sono spesso precedute da sintomi simil-influenzali quali febbre, cefalee e dolori articolari. L'eruzione può ampliarsi fino a portare alla formazione di bolle estese e alla desquamazione cutanea.

In caso di somministrazione concomitante con medicinali che abbassano la pressione sanguigna (ACE inibitori) o diuretici (in particolare, tiazide), aumenta il rischio di reazione di sensibilità, soprattutto se è presente anche un disturbo della funzionalità renale.

Esiste uno specifico gene (il cosiddetto HLA-B*5801), in presenza del quale il rischio di gravi reazioni cutanee risulta sensibilmente maggiore. Questo gene è presente particolarmente spesso in alcuni gruppi di etnie cinesi Han, indiane, thailandesi e africane.

Pertanto, nelle persone di provenienza cinese Han, indiana, thailandese o africana possono manifestarsi gravi reazioni cutanee con una maggiore frequenza.

In caso di comparsa di manifestazioni cutanee, sospenda l'assunzione di Uriconorm e informi immediatamente il suo medico.

La somministrazione contemporanea di mercaptopurina o azatioprina con allopurinolo deve essere evitata. Quando mercaptopurina o azatioprina viene somministrata insieme a Uriconorm, la dose di mercaptopurina o azatioprina deve essere ridotta perché la loro attività risulterà prolungata. Questo può aumentare il rischio di gravi disturbi del sangue. In tal caso, il medico monitorerà con attenzione la conta ematica durante il trattamento.



Si rivolga immediatamente al medico se nota qualsiasi livido inspiegabile, sanguinamento, febbre o mal di gola.

All'inizio del trattamento può insorgere un attacco acuto di gotta. Se manifesta i relativi sintomi (articolazione fortemente dolorante, arrossata, gonfia ed eccessivamente calda), contatti il suo medico.

Se si inizia il trattamento durante un attacco acuto di gotta, si possono scatenare ulteriori attacchi. Pertanto, in presenza di attacchi di gotta acuti, prima di iniziare il trattamento deve informare il suo medico, che deciderà quando debba essere iniziato il trattamento.

Durante il trattamento con Uriconorm, in casi rari, si sono manifestate vertigini. Questo farmaco può influenzare la prontezza di riflessi, la capacità di manovrare attrezzi o macchine e l'idoneità alla guida.

Uriconorm 100 mg contengono lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa, cioè è essenzialmente 'privo di sodio'.

Informi il suo medico o farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- ha allergie o
- assume altri farmaci (anche di sua iniziativa!), anche per uso esterno.

Si può assumere/usare Uriconorm durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza, l'allattamento o se pianificasse una gravidanza, Uriconorm può essere assunto soltanto dietro esplicita prescrizione del medico.

Come usare Uriconorm?

La posologia abituale è di 100 - 300 mg al giorno di Uriconorm; in casi gravi il medico può aumentare la dose fino a 900 mg.

Il medico generalmente inizierà con un basso dosaggio di allopurinolo (ad es. 100 mg/giorno) per ridurre il rischio di possibili effetti indesiderati. La dose sarà aumentata se necessario.

La dose giornaliera di 100 - 300 mg (1 compressa da 100 mg o da 300 mg) viene ingerita con una quantità sufficiente di liquido come dose singola dopo un pasto. In caso di una posologia più elevata bisogna seguire la prescrizione del medico.

Continui a prendere regolarmente le compresse anche qualora avesse dimenticato di prenderne una. La compressa rimasta la prenderà alla fine.

Non modifichi di sua iniziativa la posologia del farmaco che le è stata prescritta. Se ritiene che il farmaco agisca troppo poco o troppo, ne parli al medico o al farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Uriconorm?

Si presentano spesso manifestazioni cutanee quali arrossamento, vescicole oppure formazione di squame epidermiche.

L'assunzione di Uriconorm può comportare i seguenti effetti collaterali

In rari casi (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

- Febbre e brividi di febbre, cefalee, dolori muscolari (sintomi simil-influenzali) e sensazione generale di malessere.
- Gravi alterazioni cutanee, quali ad esempio infiammazioni in bocca, alla faringe, al naso, ai genitali così come congiuntivite (occhi rossi e gonfi), formazione di vescicole e squame epidermiche estese.
- Reazioni acute di ipersensibilità con febbre, eruzione cutanea, dolori articolari e alterazioni dell'emocromo e dei valori epatici (in tal caso può trattarsi di sintomi di una patologia da sensibilità multi-organo).



Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

- Diarrea.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Meningite asettica (infiammazione delle membrane che circondano il cervello e midollo spinale): i sintomi comprendono rigidità del collo, mal di testa, nausea, febbre o stato confusionale. Se ciò si verifica, si rivolga immediatamente ad un medico.
- Eruzione cutanea lichenoide (eruzione cutanea pruriginosa di colore rosso-violaceo e/o linee filiformi bianche-grigie sulle membrane mucose).

In caso di comparsa di manifestazioni cutanee, sospenda l'assunzione di Uriconorm e informi immediatamente il suo medico.

Prendendo sempre Uriconorm dopo pasti si possono evitare nausea e vomito.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Nel caso lei noti effetti collaterali che non sono stati qui descritti, sospenda immediatamente il trattamento e informi il suo medico o farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere usato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Conservare a temperatura ambiente (15 - 25° C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Uriconorm?

Principi attivi

Ogni compressa contiene 100 mg o 300 mg allopurinolo.

Sostanze ausiliarie

Uriconorm 100 mg contiene:

Lattosio monoidrato, amido di patata, gelatina, glicerolo 85%, talco, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato.

Uriconorm 300 mg contiene:

Amido di patata, gelatina, glicerolo 85%, talco, crospovidone, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato.

Numero dell'omologazione

39981 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Uriconorm? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, solo dietro presentazione della prescrizione medica.

Uriconorm 100 mg

Confezione da 50 compresse (divisibili).

Uriconorm 300 mg

Confezioni da 30 e 100 compresse (divisibili).

Titolare dell'omologazione



Streuli Pharma SA, 8730 Uznach.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

