

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Xatral® 2,5 mg

Sanofi-Aventis (Suisse) SA

Che cos'è Xatral 2,5 mg e quando si usa?

Nell'iperplasia (ingrossamento) benigna della prostata, i problemi di funzionamento sono legati non soltanto all'aumento del volume della ghiandola, ma anche ad una componente nervosa che, stimolata, provoca un aumento della tensione della muscolatura liscia delle vie urinarie inferiori, determinando, di conseguenza, minzione difficoltosa.

L'alfuzosina, bloccando la trasmissione di questo stimolo nervoso nella regione della prostata, determina un allentamento della tensione, facilitando in tal modo l'evacuazione delle urine.

Xatral 2,5 mg viene utilizzato per il trattamento sintomatico dell'iperplasia prostatica.

Quando non si può usare Xatral 2,5 mg?

Soltanto il medico può stabilire i casi in cui il medicinale può essere prescritto.

Il medicinale non deve essere comunque assunto:

- in caso di allergia al principio attivo o ad uno dei componenti del medicamento,
- in caso d'insufficienza grave del fegato,
- se utilizza un altro alfabloccante (nello specifico, terazosina e tamsulosina per il trattamento dell'iperplasia benigna della prostata).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Xatral 2,5 mg?

Effetti collaterali a livello cardiovascolare

Alcuni soggetti possono manifestare una particolare sensibilità a Xatral 2,5 mg che si traduce in un abbassamento della pressione arteriosa stando in posizione eretta. Nelle persone in età avanzata possono manifestarsi con maggiore frequenza effetti collaterali legati a un abbassamento della pressione arteriosa. Tale sintomatologia, che può manifestarsi nelle ore successive all'assunzione del medicamento, è preceduta da sensazioni di stanchezza, di vertigine, sudorazione e può provocare un malessere con perdita di coscienza. In questo caso, è opportuno distendersi con le gambe sollevate fino alla completa scomparsa dei sintomi che sono comunque transitori.

I pazienti che soffrono di disturbi circolatori cerebrali preesistenti sintomatici o asintomatici rischiano di incorrere in disturbi ischemici cerebrali a causa della possibile comparsa di ipotensione in seguito alla somministrazione di alfuzosina.

Deve in modo imperativo informare il suo medico

- se prende dei medicinali per il cuore o contro l'ipertensione arteriosa,
- se prende degli antimicotici del gruppo degli azoli (itraconazolo, posaconazolo, voriconazolo),
- se prende degli antiretrovirali contro l'infezione da HIV (ad es. ritonavir, cobicistat),
- se prende degli antibiotici contro le infezioni batteriche del gruppo dei macrolidi (ad es. claritromicina).

Erezione prolungata



In caso di erezione prolungata e dolorosa senza eccitazione sessuale (priapismo), consulti immediatamente il suo medico poiché il mancato trattamento adeguato del priapismo può portare a un'impotenza permanente.

Presti particolare attenzione durante la guida di un veicolo o l'uso di macchinari, dal momento che i suoi riflessi potrebbero essere rallentati, soprattutto all'inizio del trattamento, in particolare in caso di vertigini o di un abbassamento della pressione.

L'alfuzosina deve solo essere somministrata con prudenza ai pazienti che soffrono di insufficienza renale severa.

Assuma Xatral 2,5 mg soltanto dopo consultazione del medico se sa di soffrire di intolleranza ad alcuni zuccheri.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita con film, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere/usare Xatral 2,5 mg durante la gravidanza o l'allattamento?

Tenuto conto delle indicazioni, la domanda non è pertinente.

Come usare Xatral 2,5 mg?

Si attenga scrupolosamente alle istruzioni del suo medico.

Il dosaggio indicato qui sotto è soltanto indicativo, si riferisce a pazienti senza problemi cardiovascolari particolari:

Secondo prescrizione medica, assuma 1 compressa da due a tre volte al giorno.

Salvo indicazione contraria del suo medico, la prima dose deve essere assunta immediatamente prima di coricarsi.

Non modifichi di sua iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Xatral 2,5 mg?

Con l'assunzione di Xatral 2,5 mg possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Perdita di coscienza/stordimento, vertigine, malessere, mal di testa, abbassamento della pressione passando dalla posizione sdraiata o seduta alla posizione eretta, diarrea, dolore addominale, nausea, debolezza, disagio, bocca secca.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Vomito, mancamento, sonnolenza, visione alterata, palpitazioni, tachicardia, dolori al torace, gonfiore degli arti, arrossamento, rinite, sensazione di prurito, comparsa di brufoli.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Reazioni cutanee gravi (sensazione di bruciore alla pelle) che si manifestano con un'eruzione generalizzata e febbre, incidenti cerebrovascolari (nei pazienti con preesistente calcificazione delle arterie del cervello), senso di oppressione e dolore al petto (nei pazienti con una malattia cardiaca coronarica preesistente), gonfiore nella zona del viso (angioedema), aritmie cardiache, orticaria.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)



In caso di erezione prolungata e dolorosa (senza eccitazione sessuale), consulti immediatamente il suo medico curante.

Calo delle piastrine nel sangue, malattia epatica (ittero, lesioni delle cellule epatiche), complicazioni durante un intervento agli occhi come la cataratta (opacità del cristallino) o il glaucoma (pressione elevata dell'occhio).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Xatral 2,5 mg?

Principi attivi

Ogni compressa rivestita con film contiene 2,5 mg di alfuzosina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Ogni compressa rivestita con film contiene: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone K30, sodio carbossimetilamido (tipo A), magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171).

Numero dell'omologazione

50205 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Xatral 2,5 mg? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Scatole da 60 compresse.

Titolare dell'omologazione

sanofi-aventis (svizzera) sa, 1214 Vernier/GE.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

