

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Prilid Leman crème

#### Qu'est-ce que Prilid Leman crème et quand doit-elle être utilisée?

Prilid Leman crème contient comme principes actifs prilocaïne et lidocaïne. Prilid Leman a un effet anesthésique local de la peau et de la muqueuse génital.

Elle est utilisée p.ex. avant la pose de cathéters intraveineux, lors de prises de sang et d'interventions chirurgicales superficielles. Prilid Leman crème est utilisée en cas d'ulcère de jambe pour diminuer les douleurs lors du nettoyage et du débridement de la plaie.

Prilid Leman crème ne peut être utilisée que sur prescription du médecin et sous son contrôle permanent.

#### Quand Prilid Leman crème ne doit-elle pas être utilisée?

Prilid Leman crème ne doit pas être utilisée en cas d'hypersensibilité connue aux principes actifs ou à l'un des adjuvants.

Prilid Leman crème ne doit pas être appliquée sur des plaies ouvertes, à l'exception des ulcères de jambe, ni sur les muqueuses; le contact avec les muqueuses génitales des enfants doit être évité. Elle ne doit pas être appliquée dans le conduit auditif externe si le tympan n'est pas intact. Prilid Leman n'est pas approprié pour la préparation de la peau avant l'injection du vaccin antituberculeux.

#### Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Prilid Leman crème?

Utiliser Prilid Leman crème avec précaution près des yeux et des oreilles. Au cas où Prilid Leman parviendrait accidentellement dans les yeux, rincer ceux-ci immédiatement et abondamment à l'eau tiède.

Dans l'attente de plus amples renseignements cliniques, prendre les précautions suivantes chez les enfants: Prilid Leman crème ne doit pas être utilisée chez les bébés prématurés nés avant la 37<sup>e</sup> semaine de grossesse.

La quantité totale de Prilid Leman crème appliquée ne doit pas dépasser 1 g (1 g/10 cm<sup>2</sup>) chez les nouveau-nés (0–2 mois). L'endroit cutané ne doit pas être plus grand que 10 cm<sup>2</sup>. Ne laisser pas agir la crème sur la peau plus de 1 heure.

Chez les enfants de 3–12 mois, la dose appliquée de 2 g ne doit pas être dépassée. L'endroit cutané ne doit pas être plus grand que 16 cm<sup>2</sup>. Ne laisser pas agir la crème sur la peau plus de 4 heures.

Chez les patients souffrant de dermatites atopiques (inflammations cutanées), la crème ne doit pas être laissée sur la peau plus de 15–30 minutes, ni appliquée sur une grande surface (max. 10 g sur 62,5 cm<sup>2</sup>, c.-à-d. 2,5 cm × 2,5 cm/g).

Il n'est pas recommandé de traiter une surface de plus de 600 cm<sup>2</sup> (environ la dimension d'une page A4) lors d'application sur la peau rasée ou sur une surface importante: c'est-à-dire environ 1 g/10 cm<sup>2</sup> pendant



au moins 1 heure et jusqu'à 5 heures au maximum. La dose maximale ne devrait pas excéder 60 g. Informez votre médecin si vous présentez l'un des rares problèmes métaboliques suivants: déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase, méthémoglobémie congénitale ou acquise. Dans ces cas, le risque de méthémoglobémie provoquée par les médicaments est accru.

#### *Hydroxystéarate de macroglycérol*

Prilid Leman crème contient du hydroxystéarate de macroglycérol qui peut provoquer des réactions cutanées.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication!)

#### **Prilid Leman crème peut-elle être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement?**

Si vous êtes enceinte ou souhaitez le devenir, ainsi que durant la période de lactation, vous ne devez utiliser Prilid Leman crème qu'avec l'accord de votre médecin.

#### **Comment utiliser Prilid Leman crème?**

Appliquer Prilid Leman crème, d'après indication médicale, en couche épaisse sur la peau et recouvrir d'un pansement occlusif (hermétique). Le pansement occlusif peut être laissé en place jusqu'à 5 heures chez les adultes. La moitié d'un tube de 5 g correspond à environ 2 g de crème Prilid Leman. Pour obtenir 1 g de crème Prilid Leman du tube en aluminium de 30 g, extraire un ruban de crème d'environ 3,5 cm de long. En règle générale, 2 g Prilid Leman crème doit être appliquée au moins 1 heure avant l'intervention prévue.

Pour le nettoyage mécanique et/ou le débridement d'un ulcère de jambe, on appliquera en règle générale Prilid Leman crème 30 minutes au moins avant le début de l'opération. Commencer le nettoyage immédiatement après avoir ôté la crème.

#### *Pédiatrie*

Appliquer chez les nouveau-nés de 0–2 mois et ne pas dépasser 1 g ; chez les enfants âgés de 3–12 mois, ne pas dépasser 2 g. Chez les nouveau-nés de 0-2 mois maximum 1 heure, chez les enfants âgés de 3 mois jusqu'aux 12 mois, le pansement occlusif peut-être laissé jusqu'à 4 heures au maximum. A partir d'un an, le pansement occlusif peut être laissé en place jusqu'à 5 heures maximum. Après l'éloignement du pansement occlusif, l'effet persiste au moins de 2 heures.

Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous pensez que l'efficacité de votre médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

#### **Quels effets secondaires Prilid Leman crème peut-elle provoquer?**

L'utilisation de Prilid Leman peut provoquer les effets secondaires suivants:

##### *Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)*

Occasionnellement des réactions locales passagères surviennent telles que par ex. pâleur, rougeur et réaction cutanée avec légères sensations de brûlure et des démangeaisons ou oedèmes (accumulation



d'eau). Ces effets indésirables sont de brève durée et ne sont pas accentués par l'administration renouvelée ou prolongée (24–48 heures).

De hautes doses de prilocaïne peuvent favoriser la formation de méthémoglobine.

Lors d'une application correcte et conforme aux prescriptions d'emploi, des effets indésirables systémiques sont improbables. Toutefois, à l'apparition des symptômes suivants, vous devez immédiatement consulter votre médecin: nervosité, anxiété, confusion, troubles de la conscience, sensations de vertige, vision trouble ou double, sensations de chaleur ou de froid, crampes musculaires, tremblements, vomissements, baisse de la fréquence des battements cardiaques (bradycardie), baisse de la tension artérielle (hypotension), perte de connaissance.

*Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)*

Rarement se manifestent aussi des réactions allergiques. Consultez immédiatement votre médecin à l'apparition des symptômes suivants: oedèmes cutanés avec démangeaisons (urticaire), tuméfaction du visage et du cou (angiooedème), difficultés respiratoires (bronchospasmes), collapsus cardio-circulatoire (choc anaphylactique).

En cas d'application accidentelle de Prilid Leman dans les yeux, des irritations oculaires sont possibles.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

### **À quoi faut-il encore faire attention?**

#### *Stabilité*

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur l'emballage.

#### *Délai d'utilisation après ouverture*

À utiliser dans les 6 mois après ouverture.

#### *Mention concernant l'élimination des médicaments*

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### *Remarques concernant le stockage*

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C et ne pas congeler. Conserver hors de la portée des enfants.

#### *Remarques complémentaires*

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

### **Que contient Prilid Leman crème?**

1 g Prilid Leman crème contient :

#### *Principes actifs*

25 mg de lidocaïne et 25 mg de prilocaïne

#### *Excipients*



Hydroxystéarate de macrogol 40 glycérol, carbomère 974P, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

## Numéro d'autorisation

68720 (Swissmedic).

## Où obtenez-vous Prilid Leman crème? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de :

- 5 x 5 g Prilid Leman crème (avec 12 pansements)
- 1 x 5 g Prilid Leman crème (avec 2 pansements occlusifs)
- 1 x 5 g Prilid Leman crème (avec 3 pansements occlusifs)
- 1 x 30 g Prilid Leman crème (sans pansements occlusifs)
- 1 x 5 g Prilid Leman crème (sans pansements occlusifs)
- 5 x 5 g Prilid Leman crème (sans pansements occlusifs)

## Titulaire de l'autorisation

Leman SKL SA, Lancy

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

## Mode d'emploi



1. 2. 3



4. 5. 6.

1. Appliquer la crème sur la région cutanée à traiter. Évitez tout contact avec les yeux.



2. Retirer la couche médiane d'un des pansements occlusif joints à l'emballage.
3. Enlever la partie écrite inférieure.
4. Recouvrir la couche épaisse de la crème avec le pansement.
5. Enlever le cadre en papier et presser soigneusement sur tous les côtés.
6. Enlever le pansement occlusif

