

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Prilid Leman Crema

Che cos'è Prilid Leman Crema e quando si usa?

Prilid Leman Crema contiene i principi attivi prilocaina e lidocaina. Prilid Leman Crema ha un effetto anestetico locale sulla pelle e sulla mucosa genitale.

La si usa per esempio nell'ambito dell'introduzione di cateteri endovenosi, dei prelievi di sangue e di interventi chirurgici superficiali. In caso di ulcere alle gambe la crema Prilid Leman Crema si usa per ridurre i dolori durante la pulizia della ferita e in caso di sbrigliamenti della ferita.

Prilid Leman Crema si può usare soltanto su prescrizione e sotto il costante controllo del medico.

Quando non si può usare Prilid Leman Crema?

L'Prilid Leman Crema non si può usare in caso di ipersensibilità conosciuta nota ai principi attivi o ad una delle sostanze ausiliarie.

Ad eccezione delle ulcere alle gambe, la crema Prilid Leman non si deve utilizzare su altre ferite aperte, sulle mucose oppure sulla mucosa genitale dei bambini. La crema Prilid Leman non si deve applicare nel condotto uditivo esterno se il timpano non è intatto. L'Prilid Leman crema non è adatto per preparare una vaccinazione antitubercolare mediante iniezione.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Prilid Leman Crema?

In prossimità degli occhi e delle orecchie la crema Prilid Leman va usata con prudenza. Se per inavvertenza Prilid Leman venisse a contatto con gli occhi bisogna lavarli immediatamente bene con acqua tiepida.

Finché non saranno disponibili ulteriori dati clinici, nei bambini ci si deve attenere alle seguenti precauzioni:

Prilid Leman Crema non si deve usare per i prematuri nati prima della 37^a settimana di gravidanza.

Nei neonati (0-2 mesi) la quantità totale di Prilid Leman Crema applicata non deve superare 1 g (1 g/10 cm²). La zona di pelle trattata non deve superare complessivamente 10 cm². La crema non va lasciata sulla pelle per più di 1 ora.

Nei bambini da 3 a 12 mesi, la quantità totale applicata non deve superare i 2 g. La zona di pelle trattata non deve superare complessivamente 16 cm². La crema non va lasciata sulla pelle per più di 4 ore.

Nei pazienti affetti da dermatite atopica (infiammazioni della pelle) la crema non va lasciata sulla pelle per più di 15-30 minuti e non si deve applicare su superfici estese (al massimo 10 g per 62,5 cm², vale a dire 2,5 cm x 2,5 cm/g).

Quando si usa sulla pelle rasata o in caso di utilizzo su superfici ampie, non si deve trattare un'area superiore a 600 cm² (all'incirca le dimensioni di un foglio A4): circa 1 g/10 cm² per almeno 1 ora, ma non più a lungo di 5 ore. Non si deve superare la dose massima di 60 g.

Informi il medico se ha uno dei rari problemi metabolici seguenti: carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi, metaemoglobinemia congenita o acquisita. In questi casi, il rischio di una metaemoglobinemia da farmaci è aumentato.



Macrogolglicerolo idrossistearato

Prilid Leman Crema contiene macrogolglicerolo idrossistearato, che può provocare delle reazioni cutanee. Informi il medico o il farmacista nel caso in cui :

- soffra di altre malattie
- soffra di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Si può usare Prilid Leman Crema durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o prevede una gravidanza, oppure se allatta, può usare Prilid Leman Crema solo dopo aver consultato il medico.

Come usare Prilid Leman Crema?

Applicare sulla pelle uno strato spesso di Prilid Leman Crema secondo le istruzioni del medico e coprire con una medicazione occlusiva (ermetica). La medicazione occlusiva può lasciata fino a 5 ore. negli adulti. La metà di un tubo da 5 g corrisponde a ca. 2 g di crema Prilid Leman. 1 g di crema Prilid Leman da tubo d'alluminio di 30 g corrisponde ad uno strato di crema ca. 3,5 cm.

Di solito la crema Prilid Leman si deve applicare almeno 1 ora prima dell'inizio dell'intervento previsto. In caso di ulcere alle gambe di regola la crema Emla si deve applicare almeno 30 minuti prima dell'inizio della pulizia meccanica e/o dello sbrigliamento della ferita. Dopo aver tolto la crema iniziare subito la pulizia.

Pediatria

Applicare nei neonati da 0-2 mesi al massimo 1 g; nei bambini da 3 a 12 mesi al massimo 2 g. Nei neonati da 0-2 mesi al massimo 1 ora, nei bambini da 3 mesi a 12 mesi lasciare il medicazione occlusivo in posizione al massimo 4 ore. Il medicazione occlusivo può essere applicato per un massimo di 5 ore a partire dall'età di 1 anno. Dopo aver tolto la medicazione occlusiva l'effetto anestetico persiste per almeno 2 ore.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Prilid Leman Crema?

In seguito all'applicazione della crema Prilid Leman possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Occasionalmente l'Prilid Leman provoca delle reazioni locali passeggero, come ad es. pallore, arrossamento, reazioni cutanee associate ad una lieve sensazione iniziale di bruciore e prurito o edemi (accumuli di liquido nei tessuti). Questi effetti collaterali sono di breve durata e non si aggravano con un uso ripetuto o prolungato (24 – 48 ore).

La prilocaína a dosi elevate può incrementare la formazione di metaemoglobina.

Se l'applicazione avviene correttamente secondo le prescrizioni sull'uso non sono da prevedersi effetti collaterali a livello sistemico. Tuttavia è opportuno consultare subito il medico se si manifestano i seguenti sintomi: nervosismo, ansia, confusione, alterazioni dello stato di coscienza, sensazione di vertigini, vista offuscata o diplopia (veder doppio), sensazione di caldo o di freddo, crampi muscolari, tremore, vomito, ridotta frequenza cardiaca (bradicardia), abbassamento della pressione arteriosa (ipotensione), svenimento.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)



Raramente possono verificarsi anche delle reazioni allergiche. Il medico va consultato immediatamente in presenza dei seguenti sintomi: gonfiori della pelle con prurito (orticaria), gonfiore del viso e del collo (angioedema), difficoltà respiratorie (broncospasmi), collasso cardiocircolatorio (shock anafilattico). Se inavvertitamente Prilid Leman viene a contatto con gli occhi è possibile una loro irritazione. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione. .

Termine di consumo dopo l'apertura

Utilizzare entro 6 mesi dall'apertura.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperature non superiori a 30°C e non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Prilid Leman Crema?

1 g di Prilid Leman Crema contiene:

Principi attivi

25 mg di lidocaina e 25 mg di prilocaina

Sostanze ausiliarie

Idrossistearato di macrogol 40 glicerolo, carbomero 974P, sodio idrossido, acqua depurata

Numero dell'omologazione

68720 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Prilid Leman Crema? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni:

- 5 x Prilid Leman Crema da 5 g (con 12 medicazioni occlusive)
- 1 x Prilid Leman Crema da 5 g (con 2 medicazioni occlusive)
- 1 x Prilid Leman Crema da 5 g (con 3 medicazioni occlusive)
- 1 x Prilid Leman Crema da 30 g (senza medicazioni occlusive)
- 1 x Prilid Leman Crema da 5 g (senza medicazioni occlusive)
- 5 x Prilid Leman Crema da 5 g (senza medicazioni occlusive)

Titolare dell'omologazione



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Modo d'uso



1. 2. 3



4. 5. 6.

1. Applicare la crema sulla zona di pelle da trattare. Evitare il contatto con gli occhi.
2. Togliere la pellicola staccabile intermedia da una delle medicazioni occlusive accluse.
3. Togliere la parte inferiore con la dicitura.
4. Coprire con la medicazione la crema applicata in strato spesso.
5. Staccare il bordo di carta e premere accuratamente su tutti i lati.
6. Togliere la medicazione occlusiva

